


# GEJRFUGLEN

Østjysk Biologisk Forening

35. ÅRGANG.

NR. 4

DECEMBER 1999



ISSN 0900 - 4114

## Østjysk Biologisk Forening

er en forening for aktive naturinteresserede med det formål at udbrede kendskab til naturen samt at skabe kontakt mellem disse naturinteresserede.

Dette sker ved at arrangere foredragsaftener og ved tilrettelæggelse af ekskursioner og lokalitetsundersøgelser samt ved udgivelse af tidsskriftet *GEJRFUGLEN*.

Oplysninger om foreningen kan fås ved henvendelse til:

**Østjysk Biologisk Forening**  
Postbox 169,  
8100 Århus C

Indmeldelse i ØBF sker ved at indbetale kr. 100.- (eller kr. 125.- for familiekontingent) på foreningens giro nr. **7 14 83 13**. Medlemmer modtager automatisk *GEJRFUGLEN*, der normalt udkommer 4 gange om året.

Ældre årgange (før 1991) sælges for kr. 50.- Løssalg efter aftale. Ved køb af flere numre opnås prisreduktion. Enkelte årgange og enkelte numre er udsolgte.

### Gejrfuglen:

Materiale til bladet (artikler, mindre meddelelser, opfordringer til indsamlinger, tegninger, fotos m. v.) sendes til foreningen på ovenstående adresse eller til redaktøren.

Manuskripter bedes skrevet på maskine eller computer. Indsendte disketter vil blive tilbageendt efter brug hvis det ønskes. Illustrationsmateriale kan leveres som tegninger, papirbilleder eller dias. Tabeller og grafer foretrækkes leveret på diskette. Kontakt evt. Chr. Lange for at høre nærmere detaljer om formater og lignende.

### Annoncepriser:

1/2 side: kr. 60.-    1/1 side: kr. 120.-  
Kontakt bestyrelsen vedr. annoncer.

### Opsætning og layout:

Christian Lange (ansv. redaktør)  
Per G. Henriksen

ISSN 0900 - 4114

Pris for dette nummer: kr. 35.00

## Indhold

VENØ - EN ØFLORALISTE MED NOTER . . . . .	1
– STRANDE . . . . .	2
– STRANDOVERDREV . . . . .	3
– STRANDENGE. . . . .	4
– SKOVE . . . . .	5
– KÆR . . . . .	5
– SKRÆNTER . . . . .	6
– ÆNDRINGER I FLORAEN . . . . .	7
– DEN BOTANISKE UDFORSKNING AF VENØ	8
– ARTSLISTE . . . . .	9
NATURGLIMT . . . . .	28
LÆGEIGLENS BIOLOGI OG UDBREDELSE I DANMARK . . . . .	30
“FUND AF SJÆLDNERE OG NYE GULDSMEDEARTER I DANMARK 1997-1998” - EN KOMMENTAR . . . . .	35

### Tegninger og grafik:

Jens Chr. Schou: s. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 27, 29  
Tove Yde: s. 30, 34

### Fotografier:

Fotograf er angivet i billedteksterne.

### Forside:

Grafik af Chr. Lange efter foto af Kaj Halberg.

### ØBF “på nettet”:

<http://home1.inet.tele.dk/biobent/OBFdk.htm>

### E-mail:

[gejrfuglen@e-box.dk](mailto:gejrfuglen@e-box.dk)

# VENØ

## - EN Ø-FLORALISTE MED NOTER


### Erik Wessberg

Venø ligger i den sydvestlige del af Limfjorden ca. 3 km nord for Struer. Med en størrelse på ca. 640 ha hører Øen til blandt de største, der er eller vil blive beskrevet i Ø-floraserien. Øen er lang og smal: Fra Venø Odde i syd til Bradser Odde i nord er der ca. 8 km og på det bredeste sted nord for Venø By er der ca. 1,5 km.

Det meste af øen er meget kuperet med 27 meter som højeste punkt (Forstov Bakke). I den allersydligste del af øen findes marint forland i form af strandvoldssletter, medens området i nord omkring Nørskov Vig er afspærringsforland. Den store strandsø, som endnu har et afløb ved Østerøre, er dannet ved materialevandring, der har afsat de to store, ca. 1,5 km lange krumodder.

Fra retodden Venø Odde i syd er der mange gange dagligt færgeforbindelse til Kleppen i Thyland. Hele området ved Nørskov Vig er vildtreservat med adgangsforbud i perioden 1. april til 15. juli.

I modsætning til de fleste andre, beboede småøer har befolkningstallet i de sidste ca. 25 år været stigende fra 121 i 1970 til 155 i 1984. I 1990 var der 160 fastboende (Små-ø-avisen, 1990).



Guldblomme (*Arnica montana*) er fundet af både Anfred Pedersen og Benjamin og Hans Øllgaard; men jeg har ikke kunnet påvise den på mine mange ture til Øen. Det samme gælder andre overdrevarsarter som f.eks. Kattedod (*Antennaria dioica*) og Vår-Star (*Carex caryophylllea*).




Venø Kirke - Danmarks mindste kirke. Foto: Søren Højager

## Strande

Strandene er næsten overalt på Venø stenede. Kun få steder, bl.a. mellem Lillesig og Krasbjerg, er stranden overvejende med strandsand. Her er da også offentlig badestrand.


De fleste steder er stranden mere eller mindre dækket af vegetation. Kun nogle få steder er større strækninger fuldstændig blottet for planter, bl.a. ved Lillesig. Den almindeligste - og mange steder dominerende - strandplante er Strandarve (*Honckenya peploides*). På stranden ved Krasbjerg findes desuden Marehalm (*Leymus arenarius*), Gåse-Poten-

Kæmpe-Bjørneklo (*Heracleum pubescens*) er "naturligvis" også på Venø - dog endnu kun et par steder i et mindre antal. Den vokser bl.a. på den øvre del af strandvolden mellem færgelejet og Sønderskov. Forhåbentlig er man opmærksom på den, så den ikke bliver en plage, som den er blevet mange steder.



Kort over Venø med de omtalte lokaliteter anført. Kilde: Novrup & Østergaard: Fugle og Natur. En guide til Vestjylland. 1992. Udgivet af DOF - Ringkøbing Amt.

Samme forening har iøvrigt udgivet en rapport med titlen "Ynglefugleregistreringer på Venø 1985" af N. V. Pedersen 1986.



til (*Potentilla anserina*), Strand-Mælde (*Atriplex litoralis*), Klæbrig Brandbæger (*Senecio viscosus*), Kruket Skræppe (*Rumex crispus*) og Alm. Strandkamille (*Tripleurospermum maritimum ssp. salinum*) samt flere kloner af Rynket Rose (*Rosa rugosa*). Hjælme (*Ammophila arenaria*) er en meget hyppig plante på stranden, oftest hvor sandet er blæst sammen til småklitter. Det ses bl.a. ved Ørbjerg nær færgelejet. Her vokser desuden Ager-Svinemælk (*Sonchus arvensis*), Grå Bynke (*Artemisia vulgaris*) og Alm. Kvik (*Elytrigia repens*). Ved vestsiden af øen findes flere steder den nordjyske - men i det øvrige Danmark så sjældne - Strand-Limurt (*Silene maritima*).

Indtil 1965 har der været forekomst af Hornskulpe (*Glaucium flavum*) på Venø. Dengang blev den fundet på stranden syd for Firsande af Benjamin og Hans Øllgaard. Der er en god mulighed for, at den viser sig igen, da den vokser i umiddelbar nærhed - i området omkring Oddesund og ved Nissum Bredning.

### Strandoverdrev

Størstedelen af Venø Odde er strandoverdrev. Den naturlige vegetation på den flade, sandede del består bl.a. af Alm. Røllike (*Achillea millefolium*), Rød Svingel (*Festuca rubra ssp. rubra*), Bølget Bunke (*Deschamp-*

*sia flexuosa*), Sand-Star (*Carex arenaria*), Liden Klokke (*Campanula rotundifolia*), Alm. Hvene (*Agrostis tenuis*) og Vellugtende Gulaks (*Anthoxanthum odoratum*). Ved nordvestsiden findes store bevoksninger af Rynket Rose.

På strandoverdrevet ved kystskoven vest for Stodbjerg findes bl.a. Tandfri Vårsalat (*Valerianella locusta*), Flipkrave (*Teesdalia nudicaulis*) og Læge-Ærenpris (*Veronica officinalis*).

Også i nord ved Nørskov Vig har hovedparten af krumodderne ved Østerøre og Bradser Odde strandoverdrev. Fremtrædende her er Engelskgræs (*Armeria maritima* ssp. *maritima*), Sand-Star, Hjælme, Gul Snerre (*Galium verum* ssp. *verum*), Bidende Stenurt (*Sedum acre*), Rød Svingel, Klæbrig Brandbæger og Hvidmelet Gåsefod (*Chenopodium album*).


På Bradser Odde domineres strandoverdrevet af Alm. Røllike, Bidende Stenurt, Rød Svingel, Alm. Hønsetarm (*Cerastium fontanum* ssp. *triviale*), medens f.eks. Horse-Tidsel (*Cirsium vulgare*) kun findes i få individer.



Strandarve (*Honckenya peploides*) er almindelig overalt på Venø på strande og strandvolde, undertiden også på strandoverdrevne.

## Strandenge

Det er kun omkring Nørskov Vig, der findes strandenge. De største områder ligger ved Torsodde, ved Lilleodde og nord for Nørskov og Øster Nørskov ved øens nordende. Med undtagelse af sidstnævnte er området et vigtigt yngleområde for fugle, hvorfor der da også er adgangsforbud (vildtreservat) i fuglenes yngleperiode. Her findes de traditionelle strandengsarter som bl.a. Strand-Asters (*Aster tripolium*), Strand-Vejbred (*Plantago maritima*), Sandkryb (*Glaux maritima*), Harril (*Juncus gerardi*), Strandgåsefod (*Suaeda maritima*) og Vingefrøet Hindeknæ (*Spergularia media*). Slægterne Atriplex (Mælde) og Salicornia (Salturt) er godt repræsenteret i Nørskovvig-området. Af mælder findes udover Strand-Mælde (*Atriplex litoralis*) desuden Spyd-Mælde (*A. latifolia*), Udstrakt Mælde (*A. prostrata*) og Melet Mælde (*A. triangularis*) med den sjældne variant obtusifolia foruden Tand-Mælde (*A. deltoidea*) og Tykbladet Mælde (*A. glabriuscula*). Af Salturt er der fundet 2 arter: Alm. Salturt (*Salicornia europaea*) og Kortakset Salturt (*S. ramosissima*). I det tidlige efterår farver Salt-



Jordbær-Kløver (*Trifolium fragiferum*) er kun fundet ved Nørskov Vig, hvor øens eneste strandenge findes.

urarterne strandengene omkring strandsøen ved Torsodde i mange røde og gule nuancer.

## Skove

Venø rummer flere områder med skov og plantage. Størst af disse er Venø Plantage umiddelbart nord for Venø By. Ikke mindst syd og nord for byen ligger adskillige mindre skovområder.

Den lille plantage syd for Krasbjerg består hovedsagelig af Bjerg-Fyr (*Pinus mugo*), hvoraf en del blev fældet i årene op til 1990. Udover Bjerg-Fyr findes her Vorte-Birk (*Betula verrucosa*), Alm. Røn (*Sorbus aucuparia*) og Hvidgran (*Picea glauca*) samt Alm. Hyld (*Sambucus nigra*) og Alm. Gedeblad (*Lonicera periclymenum*). Desuden findes der masser af Brombær - men her udelukkende Fliget Brombær (*Rubus laciniatus*), som iøvrigt findes i skove, ved hegn og langs veje overalt på Venø. Af urter kan nævnes Fløjlsgræs (*Holcus lanatus*), Skov-Brandbæger (*Senecio sylvaticus*), Tofrøet Vikke (*Vicia hirsuta*), Alm. Mangeløv (*Dryopteris filix-mas*), Bølget Bunke og Fåre-Svingel (*Festuca ovina*).

Venø Plantage er overvejende løvskov bestående af mange forskellige træarter bl.a. Bøg (*Fagus sylvatica*), Hassel (*Corylus avellana*), Dun- og Vorte-Birk (*Betula pubescens* & *B. verrucosa*), Småbladet Lind (*Tilia cordata*), Stilk-Eg (*Quercus robur*), Selje-Pil (*Salix caprea*) og Ontarisk Poppel (*Populus x candicans*). Her er også en bevoksning af Taks (*Taxus baccata*). I skovkanterne, langs skovstierne og i åbninger i skoven findes mange brombærbuske, mest i form af Fliget Brombær (*Rubus laciniatus*) og *Rubus plicatus*; men der er også Laksebær (*Rubus spectabilis*). Blandt de mange urter kan nævnes Fingerbøl (*Digitalis purpurea*), Skvalderkål (*Aegopodium podagraria*), Skovstjerne (*Tridentalis europaea*), Alm. og Smalbladet Mangeløv (*Dryopteris filix-mas* & *D. carthusiana*), Mark-Frytle (*Luzula campestris*) samt Liden Vintergrøn (*Pyrola minor*). Ved et ødehus i skoven samt i lysninger omkring


dette findes en hel del af den ret sjældne Tadder-Vikke (*Vicia tetrasperma*) Det er iøvrigt første gang (1986), at denne art er fundet i TBU-distrikt 16.

## Kær

Venø rummer en hel del kær bl.a. ved Lillesig, ved kysten syd for Firbjerg, mellem Venø By og havnen og ved Vejsbjerg Gårde. I kæret ved Lillesig, der for størstepartens vedkommende ligger på mager sandbund, findes bl.a. Børste-Siv (*Juncus squarrosus*), Klokkelyng (*Erica tetralix*), Glat Ærenpris (*Veronica serpyllifolia*), Knæbøjet Rævehale (*Alopecurus geniculatus*), Glanskapslet Siv (*Juncus articulatus*), Lådden Dueurt (*Epilobium hirsutum*), Mose-Bunke (*Deschampsia caespitosa*), Blåtop (*Molinia coerulea*), Tagrør (*Phragmites australis*), Krybende Hvene (*Agrostis stolonifera*) og Mose-Bølle (*Vaccinium uliginosum*). Ved en hættemågekoloni findes bl.a. Ager-Svinemælk (*Sonchus arvensis*), Kær-Galtetand (*Stachys palustris*), Svine-Mælde (*Atriplex patula*) og Musehale (*Myosurus minimus*).



Klokkelyng (*Erica tetralix*) er af Benjamin og Hans Øllgaard angivet som almindelig. Da flere kærømråder i de mellemliggende år er forsvundne, kan den nu kun betegnes "hist og her".



Rundbladet Soldug (*Drosera rotundifolia*) er atter et eksempel på en art, som tidligere er set af både Anfred Pedersen og B. & H. Øllgaard; de to sidstnævnte har endog set arten to steder: i kær ved Venø By (Venø Kær) og i kær ved Vejsbjerg Gårde. Jeg har ikke kunnet finde den!

I kæret mellem havnen og Venø By (Venø Kær) vokser bl.a. Kær-Tidsel (*Cirsium palustre*), Kær-Dueurt (*Epilobium palustre*), Sump-Evighedsblomst (*Gnaphalium uliginosum*), Kær-Mangeløv (*Thelypteris palustris*), Eng-Viol (*Viola palustris*), Vandnavle (*Hydrocotyle vulgaris*), Tusindfrø (*Radiola linoides*), Nikkende Brøndsel (*Bidens cer-*

*nua*) og Tandbælg (*Sieglingia decumbens*). Hvor der er mest vådt, ses arter som Vand-Skræppe (*Rumex hydrolapathum*), Bredbladet Dunhammer (*Typha latifolia*) og Tykakset Star (*Carex riparia*), som er en sjælden art i Nord- og Vestjylland.

Rønkær ved Venø havn afgrænses mod nord af en grøft, hvortil spildevand fra den østligste del af Byen tilledes urensset. Grøften var (1985) fyldt med "lammehaler", og den var meget ildelugtende. Selve Rønkær er for størstepartens vedkommende relativt tørt og området er dækket af lave og spredtstående Tagrør. Der er kun få arter i dette kær bl.a. Harril (*Juncus gerardi*), Katteskæg (*Nardus stricta*), Blågrøn Kogleaks (*Scirpus tabernaemontani*) og Kær-Trehage (*Triglochin palustre*).

Området mellem Vejsbjerg Gårde og Venø Plantage samt området syd for Vejsbjerg Gårde består hovedsagelig af kær og enge, hvoraf en del afgræsses af kreaturer, medens andre arealer ikke egner sig til afgræsning på grund af, at de er for våde og sumpede. I hele området taget under et vokser der bl.a. Hirse-Star (*Carex panicea*), Lyse-Siv (*Juncus effusus*), Tråd-Siv (*J. filiformis*), Eng-Viol (*Viola palustris*), Smalbladet Kæruld (*Eriophorum angustifolium*), Kær-Tidsel (*Cirsium palustre*), Eng-Nellikerod (*Geum rivale*), Kragefod (*Potentilla palustre*), Kær-Snerre (*Galium palustre ssp. palustre*) samt Bidende Ranunkel (*Ranunculus acris*).

## Skrænter

Når der ses bort fra den sydlige tredjedel af Øen og området omkring Nørskov Vig, har Venø stejle kystskrænter. Højest når disse i vest med Forstov Bakke på knap 27 meter, medens Vejsbjerg og Firbjerg begge er ca. 17 meter høje. Iøvrigt benyttes de høje skrænter ivrigt af drageflyvere.

Skrænten, der strækker sig fra Firbjerg og til havnen, domineres af 2 arter: Hedelyng (*Calluna vulgaris*) og Revling (*Empetrum nigrum*). Desuden findes bl.a. Blåmunke (*Jasione montana*), Blåhat (*Knautia arvensis*),





Klint ved Vejsbjerg, Venø. Foto: Søren Højager.

Sand-Star (*Carex arenaria*), Bølget Bunke (*Deschampsia flexuosa*), Vellugtende Gulaks (*Anthoxanthum odoratum*) og Gul Snerre (*Galium verum ssp. verum*). Øverst på skrænten vokser der bl.a. Smalbladet Timian (*Thymus serpyllum*) og Kattesæg (*Nardus stricta*).

Nord for havnen er skrænten flere steder præget af skred. Også her dominerer Hedlyng og Revling over store områder. Af de øvrige plantearter kan nævnes Rundbælg (*Anthyllis vulneraria*), Liden Klokke (*Campanula rotundifolia*), Alm. Engelsød (*Polypodium vulgare*), Alm. Kongepen (*Hypochaeris radicata*) og Lyng-Snerre (*Galium saxatile*). På steder med trykvæld findes bl.a. Kærtidsel (*Cirsium palustre*), Klokkelyng (*Erica tetralix*), Mose-Bølle (*Vaccinium uliginosum*), Kambregne (*Blechnum spicant*), Vandnavle (*Hydrocotyle vulgaris*) og Tormentil (*Potentilla erecta*). Bemærkelsesværdig er den store forekomst af Smuk Perikon (*Hypericum pulchrum*).


Medens vestsiden af øen består af to store og sammenhængende skræntsyste­mer, er østkystens skrænter både meget lavere og mindre i udstrækning. På skrænten nord og syd for Krasbjerg, hvis højeste punkt er 13,5 meter, vokser bl.a. Alm. Torskemund (*Linaria vulgaris*), Ager-Snerle (*Convolvulus arvensis*), Alm. Pimpinelle (*Pimpinella saxifraga*), Blåmunke samt flere små bestande af Filtbladet Kongelys (*Verbascum thapsus*).

### **Ændringer i floraen**

Det er tankevækkende, at 187 arter mv., som er set af Wiinstedt (1914), Pedersen (1955 & 1962) og Benjamin og Hans Øllgaard (1965), ikke har kunnet findes af mig. Det drejer sig især om overdrevsplanter, planter fra vådområder og arter, der på landsplan er truede. Der er stadig overdrev på Venø; men der er ingen tvivl om, at arealet i de sidste par menneskealdre er reduceret betydeligt. Alt, der kan opdyrkes, er blevet lagt under plov. Kun

de stejleste og mest kuperede småområder henligger uopdyrkede. Blandt de mange overdrevarsarter, der sandsynligvis ikke mere findes på Venø, kan nævnes Kattetod (*Antennaria dioica*), Guldblomme (*Arnica montana*), Vår-Star (*Carex caryophyllea*), Plettet Gøgeurt (*Dactylorhiza maculata ssp. maculata*), Bakke-Nellike (*Dianthus deltoides*), Ene (*Juniperus communis*), Alm. Mælkeurt (*Polygala vulgaris*) og Vild Hør (*Linum catharticum*).

Ligeledes er mange arter, der er knyttet til ferskvands- og vådbundslokaliteter, sandsynligvis forsvundne. Det drejer sig bl.a. om Vejbred-Skeblad (*Alisma plantago-aquatica*), Søpryd (*Baldellia ranunculoides*), Næb-Star (*Carex rostrata*), Fåblomstret Kogleaks (*Eleocharis quinqueflora*), Klokke-Ensian (*Gentiana pneumonanthe*), Bredbægret Ensian (*Gentianella campestris ssp. campestris*), Eng-Ensian (*G. uliginosa*), Svømmende Sumpskærm (*Helosciadium inundatum*), Bukkeblad (*Menyanthes trifoliata*), Leverurt (*Parnassia palustris*), Strandbo (*Littorella uniflora*) samt Vandaksarterne Rust-Vandaks, Svømmende Vandaks, Hjertebladet Vandaks, Aflangbladet Vandaks og Liden Vandaks (*Potamogeton alpinus*, *P. natans*, *P. perfoliatus*, *P. polygonifolius* & *P. pusillus*). Enge, kær og moser findes i dag primært ved Vejsbjerg Gårde og på nordsiden af vejen mellem Venø By og havnen. Området ved Rønkjær er stort set udtørret og Tagrørdomineret, medens området ved Lillesig henligger ugræsset, og det er ret artsfattigt.



Marts-Viol (*Viola odorata*) Mangler sjældent som naturaliseret på vore beboede småøer. Den er da også set af såvel Anfred Pedersen i 1955 og 1962 som af B. & H. Øllgaard i 1965. Jeg har set den flere steder, bl.a. i Byen.

## Den botaniske udforskning af Venø

Så vidt vides, påbegyndtes udforskningen af floraen på Venø af Knud Wiinstedt, der i 1913-14 havde fået til opgave for T.B.U. at kortlægge floraen i distrikt 16. Desværre er der på Botanisk Museum kun efterladt en lille liste fra ham omfattende 20 arter. Disse er i min floraliste mærket 1914 (KW).

Fra årene 1955 og 1962 findes der på museet omfattende floralister af Anfred Pedersen, her mærket enten 1955 (AP), 1962 (AP) eller 1955, 1962 (AP). I 1965 besøgte Benjamin og Hans Øllgaard Venø. De har også optegnet en liste over planter fra Øen. Efter deres besøg var der ialt kendt 510 taxa fra Øen. Arter fundet af Benjamin og Hans Øllgaard er i min floraliste mærket 1965 (Øllg.).

Under mine besøg på Venø den 26. juli 1985, 24. maj 1986, 28. juni 1986, 8. maj 1989, 20. sept. 1989, 22. aug. 1991 og den 2. juli 1992 er der fundet yderligere 127 nye arter mv. for Venø, heraf 70 tilhørende slægten Mælkebøtte (*Taraxacum*). Ialt er der nu kendt 637 taxa fra Øen.

De anvendte plantnavne følger for størstedelens vedkommende Dansk Feltflora (Hansen 1991). For Atriplex' vedkommende er dog benyttet Pedersen (1968) og for Rubus Pedersen & Schou (1989).

Arter, der er set af mig, er mærket med et "!". Såfremt en art er set mange steder på øen, er der brugt hyppighedsbetegnelsen "alm.". For de mindre hyppige arters vedkommende er brugt udtrykket "bl.a.", og hvis en art kun er set ét sted, er dette sted anført.

## Artsliste (alfabetisk)

- Abies alba* (Alm. Ædelgran) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i plantage vest for Stodbjerg !  
- *nordmanniana* (Nordmannsgran) - 1965: plantet (Øllg.)
- Acer campestre* (Navr) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i hegn ved Nørskov !  
- *pseudoplatanus* (Ahorn) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. på vejkant øst for Firbjerge !
- Achillea millefolium* (Alm. Røllike) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm !  
- *ptarmica* (Nyse-Røllike) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd for Sønder skov, Forstov Bakke (Øllg.) - bl.a. i hedekær ved Lillesig !
- Aegopodium podagraria* (Skvalderkål) - 1955, 1962 (AP) - 1965: flere steder (Øllg.) bl.a. på vejkant sydvest for Vejsbjerg Gårde !
- Aesculus hippocastanum* (Hestekastanje) - 1965: plantet (Øllg.)
- Aethusa cynapium* (Hundepersille) - 1962 (AP)
- Agrostemma githago* (Klinter) - 1955 (AP)
- Agrostis canina* (Hunde-Hvene) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Vejsbjerggårde, Venøby Kær, Hylbjerg Høj (Øllg.)  
- *gigantea* (Stortoppet Hvene) - 1955, 1962 (AP) - 1965: nord for Nørreris (Øllg.) - bl.a. i hedekær nord for Lillesig !  
- *stolonifera* (Krybende Hvene) - 1955 (AP) - 1965: alm. ved stranden (Øllg.) - alm. !  
- *tenuis* (Alm. Hvene) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Aira caryophylla* (Udspærret Dværgbunke) - 1955, 1962 (AP) - 1965: flere steder (Øllg.) - bl.a. i plantage ved Firbjerge !  
- *praecox* (Tidlig Dværgbunke) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Alisma plantago-aquatica* (Vejbred-Skeblad) - 1955, 1962 (AP)
- Allium scorodoprasum* (Skov-Løg) - 1955, 1962 (AP) - 1965: præstegården (Øllg.) - skrænt syd for havnen !
- Alnus glutinosa* (Rødel) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i kær ved Vejsbjerg Gårde !
- Alopecurus geniculatus* (Knæbøjet Rævehale) - 1955 (AP) - 1965: alm. på fugtige steder (Øllg.) - alm. på fugtige steder !  
- *pratensis* (Eng-Rævehale) - 1965: Venø By (Øllg.) - mark ved Rønkær!
- Althaea officinalis* (Læge-Stokrose) - 1965: plantet (Øllg.)
- Ammophila arenaria* (Hjælme) - 1955, 1962 (AP) - 1965: kysten (Øllg.) bl.a. på stranden ved Møgelsig !
- Amsinckia micrantha* (Småblomstret Gulurt) - mark nord for Nørreknak !
- Anagallis arvensis* (Rød Arve) - 1955 (AP) - 1965: alm. ukrudt og hist og her på sandstrand (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Krasbjerg !
- Anchusa arvensis* (Krumhals) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !  
- *officinalis* (Læge-Oksetunge) - 1955, 1962 (AP)
- Anemone nemorosa* (Hvid Anemone) - 1965: ved foden af Forstov Bakke (Øllg.)
- Angelica sylvestris* (Skov-Angelik) - 1965: flere steder (Øllg.) - hedekær ved Møgelsig !
- Antennaria dioica* (Kattefod) - 1955, 1962 (AP)
- Anthemis arvensis* (Ager-Gåseurt) - 1965: alm. på dyrket jord (Øllg.) - bl.a. i mark mellem Sønderis og Venø By !
- Anthoxanthum odoratum* (Vellugtende Gulaks) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
- Anthriscus sylvestris* (Vild Kørvel) - 1962 (AP) - 1965: præstegården (Øllg.) bl.a. på vejkant ved Venø Plantage !
- Anthyllis vulneraria* (Rundbælg) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. på hedestykke sydøst for Vejsbjerg Gårde !

- Apera spica-venti* (Vindaks) - 1955, 1962 (AP)
- Aphanes arvensis* (Alm. Dværgløvefod) - 1962 (AP) - mark ved Krasbjerg !
- *microcarpa* (Småfrugtet Dværgløvefod) ~ 1955 (AP) - 1965: syd for Nørreris, Arkbjerg, Hylbjerg Høj (Øllg.)
- Aquilegia vulgaris* (Akeleje) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.) - bl.a. ved vejkant sydvest for Vejsbjerg Gårde !
- Arabidopsis thaliana* (Gåsernad) - 1955, 1962 (AP) 1965: ukrudt ved Sønderskov (Øllg.) alm. !
- Arctium lappa* (Glat Burre) bl.a. på skrænt ved Nørskov !
- *minus* (Liden Burre) 1955, 1962 (AP)
  - *tomentosum* (Filtet Burre) - 1965: havnen, ryddepladser, ved huse (Øllg.)
- Arenaria serpyllifolia* (Alm. Markarve) - 1955 (AP) - 1965: strandvolde, ukrudt (Øllg.) bl.a. i mark syd for Krasbjerg !
- Armeria maritima* ssp. *maritima* (Alm. Engelskgræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Armoracia rusticana* (Peberrod) - 1955 (AP) - 1965: forvildet (Øllg.) bl.a. på vejkant ved Venø Kro i Venø By !
- Arnica montana* (Guldblomme) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Stenkast, Vejsbjerg Gårde (Øllg.)
- Arrhenatherum elatius* (Draphavre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på dige ved Rønkær !
- Artemisia absinthium* (Have-Malurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, Hylbjerg Høj (Øllg.)
- *vulgaris* (Grå Bynke) - 1955 (AP) - 1965: flere steder (Øllg.) - bl.a. på strandvold ved Møgelsig !
- Asparagus officinalis* (Asparges) - 1965: forvildet ved Nørreris (Øllg.) - bl.a. ved vejkant øst for Firbjerge !
- Aster x salignus* (Pilebladet Asters) - 1965: forvildet i Venø By (Øllg.)
- *tripolium* (Strand-Asters) - 1914 (KW) - 1962 (AP) - 1965: strandenge (Øllg.) - bl.a. på strandeng ved Nørskov Vig !
- Athyrium filix-femina* (Fjerbregne) - skoven ved Venø By !
- Atriplex deltoidea* (Tand-Mælde) - 1962 (AP) - Marehalm-samfund øst for Nørskov !
- *glabriuscula* (Tykbladet Mælde) - 1962 (AP) - sandstrand øst for Nørskov !
  - *latifolia* s. str. (Spyd-Mælde) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *litoralis* inkl. f. *serrata* (Strand-Mælde) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. på stranden ved Bradser Odde !
  - *patula* (Svine-Mælde) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. på stranden (Øllg.) - bl.a. i kær ved Lillesig !
  - *prostrata* (Udstrakt Mælde) - 1962 (AP) - ved strandsø ved Bradser Odde !
  - *triangularis* (Melet Mælde) - strand syd for Bradser Odde !
  - var. *obtusifolia* - strand syd for Bradser Odde !
- Avena brevis* (Kort Havre) - Bot. Tidsskr. 68, 1973
- *fatua* (Flyve-Havre) - mark syd for Venø By !
  - *sativa* (Alm. Havre) - 1965: forvildet (Øllg.)
- Baldellia ranunculoides* (Søpryd) - 1914 (KW)
- ? *Barbarea intermedia* (Randhåret Vinterkarse) - 1965: Lillesig (Øllg.)
- *vulgaris* ssp. *vulgaris* (Alm. Vinterkarse) - mark ved Rønkær !
- Batrachium trichophyllum* (Hårfliget Vandranunkel) - 1914 (KW) - 1965: Rønkær (Øllg.)
- Bellis perennis* (Tusindfryd) - 1955 (AP) - 1965: hyppig (Øllg.)
- Beta vulgaris* ssp. *vulgaris* (Foder-Bede) - 1965: forvildet på stranden (Øllg.)
- Betula pendula* (Vorte-Birk) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - alm. !

- Betula pubescens* (Dun-Birk) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - bl.a. i skov nordvest for Firbjerge !
- Bidens cernua* (Nikkende Brøndsel) - mose ved Vejsbjerg Gårde !
- Blechnum spicant* (Kambregne) - 1965: Forstov Bakke i mængde (Øllg.) - Forstov Bakke !
- Blysmus rufus* (Rødbrun Kogleaks) - 1965: Rønkær (Øllg.) - Rønkær!
- Borago officinalis* (Hjulkrone) - strandoverdrev syd for Byen (affaldshenkastning) !
- Brassica campestris* (Ager-Kål) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ukrudt (Øllg.)
- *napus* (Raps) - 1955 (AP) - bl.a. på strandfæll ved Lillesig !
  - *oleracea* (Have-Kål) - 1965: forvildet (Øllg.)
- Briza media* (Alm. Hjertegræs) - Vejsbjerg !
- Bromus arvensis* (Ager-Hejre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Øst for Venø By (Øllg.)
- *hordeaceus* ssp. *hordeaceus* inkl. var. *leiostachys* (Blød Hejre) - 1955 (AP) 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *thomii* (Liggende Hejre) - 1965: havnen (Øllg.)
  - *rigidus* - 1955: Serradelmark (AP)
- Cakile maritima* ssp. *maritima* (Vesterhavs-Strandsennep) - 1955, 1962 (AP) - 1965: stranden, temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. på stranden ved Krasbjerg !
- Calamagrostis epigeios* (Bjerg-Rørhvene) - 1955 (AP) - 1965: Sorthøj (Øllg.) bl.a. på hedestykke nordvest for Nørreknak !
- Callitriche hamulata* (Smalbladet Vandstjerne) - 1965: Rønkjær, Venø By, kær (Øllg.)
- *stagnalis* (Storfrugtet Vandstjerne) - 1955 (AP) 1965: Rønkjær (Øllg.)
- Calluna vulgaris* (Hedelyng) - 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
- Campanula rapunculoides* (Ensidig Klokke) - 1965: præstegården (Øllg.)
- *rotundifolia* (Liden Klokke) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. - alm. !
- Capsella bursa-pastoris* (Hyrdetaske) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
- Caragana arborescens* (Ærtebusk) - 1965: plantet (Øllg.)
- Cardamine pratensis* ssp. *pratensis* (Engkarse) - 1955 (AP) - 1965: Rønkjær, Venø By, kær (Øllg.)
- Carex arenaria* (Sand-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- *caryophyllea* (Vår-Star) - 1955, 1962 (AP)
  - *echinata* (Stjerne-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: væld og moser (Øllg.)
  - *flacca* (Blågrøn Star) - 1965: nord for Firbjergsande (Øllg.) - Krasbjerg !
  - *hirta* (Håret Star) - 1965: Østkysten mod syd, temmelig alm. (Øllg.)
  - *lepidocarpa* (Tråd-Star) - 1955, 1962 (AP)
  - *leporina* (Hare-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret., alm. (Øllg.) - bl.a. ved vandhul øst for Firbjerge !
  - *nigra* (Alm. Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret alm. (Øllg.) - bl.a. ved mose sydøst for Vejsbjerg Gårde !
  - *oederi* ssp. *oederi* (Dværg-Star) - 1955 - 1962 (AP) - 1965: Rønkjær, syd for Firbjergsande (Øllg.)
  - *panicea* (Hirse-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - mose sydøst for Vejsbjerg Gårde !
  - *pilulifera* (Pille-Star) ~ 1955, 1962 (AP) - 1965: hyppig i hederne (Øllg.) - ung plante ved Forstov Bakke !
  - *riparia* (Tykakset Star) - 1965: stor bestand i mose ved Vejsbjerg Gårde (Øllg.) - Venø Kær !
  - *rostrata* (Næb-Star) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Vejsbjerg Gårde, Venø By, kær (Øllg.)

- Carlina vulgaris* ssp. *vulgaris* (Alm. Bakketidse) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Ørbjerg, Skånbjerg, Hylbjerg Høj (Øllg.) skrænt syd for havnen !
- Centaurea cyanus* (Kornblomst) - 1965: temmelig alm. ukrudt (Øllg.) bl.a. i mark øst for Firbjerge !
- *scabiosa* (Stor Knopurt) - Krasbjerg !
- Centaureum erythraea* (Mark-Tusindgylden) - 1955 (AP) - 1965: Rønkær (Øllg.) -
- - var. *capitatum* (Hoved-Tusindgylden) - strandenge ved Nørskov Vig (Øllg.)
  - *pulchellum* (Liden Tusindgylden) - 1955, 1962 (AP) - 1965: strandeng ved Nørskov Vig, Rønkær (Øllg.)
- Centunculus minimus* (Knudearve) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
- Cerastium arvense* (Storblomstret Hønsetarm) - 1965: Hylbjerg Høj (Øllg.)
- *fontanum* ssp. *triviale* var. *triviale* (Alm. Hønsetarm) 1955 (AP) -1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - - ssp. *triviale* var. *holosteoides* (Ensidig Hønsetarm) - 1955 (AP)
  - *semidecandrum* (Femhannet Hønsetarm) - 1955 (AP) 1965: strandvolde, flere steder (Øllg.) bl.a. på strandoverdrev nordvest for Lillesig !
  - *tomentosum* (Gråbladet Hønsetarm) - 1965: forvildet Venø By (Øllg.)
- Chamaenerion angustifolium* (Gederams) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Chamomilla suaveolens* (Skive-Kamille) - 1955 (AP), - 1965: ved huse (Øllg.) - alm. !
- Chenopodium album* (Hvidrnelet Gåsefod) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
- *suecicum* (Grøn Gåsefod) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
- Chrysanthemum segetum* (Gul Okseøje) - 1955 (AP)
- Cirsium arvense* (Ager-Tidse) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- *palustre* (Kær-Tidse) - 1955 (AP) - 1965: temnelig alm. (Øllg.) bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gård !
  - *vulgare* (Horse-Tidse) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Cochlearia danica* (Dansk Kokleare) - 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. ved kysten (Øllg.)
- *officinalis* (Læge-Kokleare) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. på strandbred ved Krasbjerg!
- Convallaria majalis* (Liljekonval) 1955, 1962 (AP) - 1965: plantet (Øllg.) -krat ved Hylbjerg Gård !
- Convolvulus arvensis* (Ager-Snerle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: flere steder (Øllg.) bl.a. på vejkant ved Rønkjær !
- Conyza canadensis* (Canadisk Bakkestjerne) - bl.a. på vejkant ved Nørreris !
- Corylus avellana* (Hassel) - 1965: hist og her (Øllg.) - Venø Plantage !
- Corynephorus canescens* (Sandskæg) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) -hedestykke ved Nørskov !
- Crataegus monogyna* (Engriflet Hvidtjørn) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Crepis capillaris* (Grøn Høgeskæg) - 1962 (AP) - 1965: Nørreris, Hylbjerg Høj (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Nørreris !
- *tectorum* (Tag-Høgeskæg) - 1965: ukrudt ved Nørreris (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Krasbjerg !
- Cynosurus cristatus* (Alm.. Kamgræs) 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.)
- Dactylis glomerata* (Alm. Hundegræs) 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Dactylorhiza maculata* ssp. *maculata* (Plettet Gøgeurt) - 1962 (AP)
- Daucus carota* ssp. *carota* (Vild Gulerod) - 1965: Ørbjerg (Øllg.)
- Deschampsia caespitosa* (Mose-Bunke) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. i kær nord for Lillesig !
- *flexuosa* (Bølget Bunke) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !

- Descurainia sophia* (Finbladet Vejsennep) - 1962 (AP)
- Dianthus deltoidea* (Bakke-Nellike) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Arkbjerg, Hylbjerg Høj (Øllg.)
- Digitalis purpurea* (Fingerbøl) - 1962 (AP) - 1965: flere steder forvildet (Øllg.) bl.a. på vejkant ved Hylbjerg Gård !
- Drosera rotundifolia* (Rundbladet Soldug) - 1955, 1962 (AP) -1965: Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde (Øllg.)
- Dryopteris carthusiana* (Smalbladet Mangeløv) - 1955 (AP) -1965: alm. i plantager (Øllg.) - bl.a. i Venø Plantage !
- *dilatata* (Bredbladet Mangeløv) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. i plantage vest for Stodbjerg !
  - *filix-mas* (Alm. Mangeløv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. i skov vest for Sønderriis !
- Echium plantagineum* - 1955: Serradelmark (AP)
- *vulgare* (Slangehoved) - 1962 (AP) - 1965: Venø By (Øllg.) - Venø By !
- Eleocharis multicaulis* (Mangestænglet Sumpstrå) - 1914 (KW) - 1962 (AP)
- *palustris* ssp. *vulgaris* (Alm. Sumpstrå) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær (Øllg.)
  - *quinqueflora* (Fåblomstret Kogleaks) - 1914 (KW) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
  - *uniglumis* (Enskallet Sumpstrå) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.) - kær ved Nørreris !
- Elytrigia junceiforme* (Strand-Kvik) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
- *x repens* (Hybrid-Kvik) -1962 (AP) - 1965: alm. på stranden (Øllg.) - bl.a. på stranden ved Krasbjerg !
  - *repens* (Alm. Kvik) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *trachycaulon* - 1955: Serradelmark (AP)
- Empetrum nigrum* (Revling) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Epilobium hirsutum* (Ladden Dueurt) - hedekær nord for Lillesig !
- *montanum* (Glat Dueurt) - hedekær nordvest for Lillesig !
  - *palustre* (Kær-Dueurt) - 1955 (AP) - 1965: Rønkjær, Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde (Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
- Equisetum arvense* (Ager-Padderok) - 1955. 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- *hyemale* (Skavgræs) - 1962 (AP) - Krasbjerg !
  - *palustre* (Kær-Padderok) - 1965: Øst for Venø By (Øllg.)
- Erica tetralix* (Klokkelyng) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i kær sydvest for Vejsbjerg Gårde !
- Erigeron acre* (Bitter Bakkestjerne) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.)
- Eriophorum angustifolium* (Smalbladet Kacruld) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde (Øllg.) - bl.a. i kær ved Venø By !
- Erodium cicutarium* (Hejrenæb) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. ukrudt (Øllg.) -alm. !
- Erophila verna* (Vår-Gæslingeblomst) - bl.a. på skrænt ved Nørreris !
- Euphorbia helioscopia* (Skærm-Vortemælk) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) bl.a. på overdrev ved Nørreris !
- *peplus* (Gaffel-Vortemælk) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) bl.a. på vejkant i Venø By !
- Euphrasia brevipila* ssp. *brevipila* (Kirtel-Øjentrøst) - 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -skovvej nordvest for Nørskov !
- *curta x brevipila* - Bt 59, 1963

- Euphrasia micrantha* (Lyng-Øjentrøst) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Risbjerg, syd for Krasbjerg og nord for Sønderskov (Øllg.)
- *stricta* (Spids Øjentrøst) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) vejkant ved Havstokken !
- Fagus sylvatica* (Bøg) - 1965: plantet (Øllg.) - Venø Plantage !
- Festuca ovina* (Fåre-Svingel) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. på lyngbakke ved Stodbjerg !
- *pratensis* (Eng-Svingel) - 1955 (AP) - 1965: dyrket og forvildet på grøftekanter (Øllg.) - bl.a. i hegn ved Vejsbjerg Gårde !
  - *rubra* ssp. *arenaria* - 1965: kysten (Øllg.)
  - - ssp. *rubra* (Rød Svingel) - 1955 (AP) - 1965: m.alm. (Øllg.) - alm. !
- Filago minima* (Liden Museurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Øster Nørskov, Hylbjerg Høj (Øllg.) - ung grankultur ved Nørskov !
- *vulgaris* (Kugle-Museurt) - 1955, 1962 (AP)
- Filipendula ulmaria* (Alm. Mjødurt) - 1965: Rønkjær (Øllg.)
- Fragaria x ananassa* (Have-Jordbær) - 1965: forvildet (Øllg.) - skrænt øst for Venø By !
- Fraxinus excelsior* (Ask) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. ved vejkant øst for Firbjerge !
- Fumaria muralis* (Mur-Jordrøg) - markskel i Venø Plantage !
- *officinalis* (Læge-Jordrøg) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Hylbjerg Høj (Øllg.) - bl.a. på vejkant sydvest for Vejsbjerg Gårde !
- Galeopsis bifida* (Skov-Hanekro) - 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - alm. !
- *speciosa* (Hamp-Hanekro) - rydning Øst for Firbjerge !
  - *tetrahit*, inkl. f. *albiflora* (Alm. Hanekro) - 1955 (AP) - 1965: ryddeplads ved Sønderskov (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Krasbjerg !
- Galinsoga quadriradiata* (Kirtel-Kortstråle) - have ved Sønderskov !
- Galium aparine* (Burre-Snerre) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på stenet strandvold ved Møgelsig !
- *elatum* (Bredbladet Snerre) - 1962 (AP)
  - - var. *tyrolense* - 1955: Serradelmark (AP)
  - *mollugo* (Hvid Snerre) - 1965: Øster Nørskov (Øllg.) overdrev sydøst for Vejsbjerg Gårde !
  - *palustre* (Kær-Snerre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. på sumpede steder (Øllg.) - bl.a. i kær sydøst for Vejsbjerg Gårde !
  - *saxatile* (Lyng-Snerre) - 1955, 1962 (AP) 1965: alm. i hederne (Øllg.) - alm. !
  - *sternerii* (Liden Snerre) - skovlysning i Venø Plantage !
  - *verum* ssp. *verum* (Gul Snerre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Genista anglica* (Engelsk Visse) - 1955 (AP) - 1965: alm. i hede (Øllg.) -alm. på hederne !
- *tinctoria* (Farve-Visse) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. i hede (Øllg.) bl.a. på hede nordøst for Vejsbjerg Gårde !
- Gentiana pneumonanthe* - 1955, 1962 (AP) - 1965: Vejsbjerg Gårde, Venø By, kær (Øllg.)
- Gentianella campestris* ssp. *campestris* (Bredbægret Ensian) - 1965: Rønkjær, syd for Firbjerg sande (Øllg.)
- *uliginosa* (Eng-Ensian) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
- Geranium dissectum* (Kløftet Storkenæb) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.)
- *molle* (Blød Storkenæb) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *pratense* (Eng-Storkenæb) - 1965: forvildet Venø By (Øllg.)
  - *pusillum* (Liden Storkenæb) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Øster Nørskov (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Nørreris !



- Geranium pyrenaicum* (Pyrenæisk Storckenæb) - 1955 - 1962 (AP)
- Geum rivale* (Eng-Nellikerod) - mose sydøst for Vejsbjerg Gårde !
- *urbanum* (Feber-Nellikerod) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. på vejkant øst for Byen !
- Glaucium flavum* (Hornskulpe) - 1914: på stranden syd for Byen i mængde (KW) -1962: Nørskov (AP) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
- Glaux maritima* (Sandkryb) - 1955, 1962 (AP) 1965: strandenge, alm. (Øllg.) - alm. !
- Glechoma hederacea* (Korsknap) - 1965: forvildet flere steder (Øllg.) - hegn sydvest for Vejsbjerg Gårde !
- Glyceria fluitans* (Manna-Sødgræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: flere steder (Øllg.) kær ved Venø By !
- Gnaphalium sylvaticum* (Rank Evighedsblomst) - 1955 (AP) - 1965: Øster Nørskov (Øllg.)
- *uliginosum* (Sump-Evighedsblomst) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. ved vandhul Øst for Firbjerg !
- Hedera helix* (Vedbend) - Venø Plantage !
- Helianthus* sp. 1965: ryddepladser (Øllg.)
- Helosciadium inundatum* (Svømmende Sumpskærm) - 1914 (KW) - 1955, 1962 (AP)
- Hemerocallis* sp. (Daglili) - 1965: forvildet (Øllg.)
- Heracleum pubescens* (Kæmpe-Bjørneklo) 1955 (AP) -1965: præstegården (Øllg.) bl.a. på stranden sydvest for Møgelsig !
- Herniaria glabra* (Brudurt) - 1955 (AP) 1965: Venø By
- Hieracium auriglandulum* - plantage nordvest for Sønderskov !
- *pilosella* (Håret Høgeurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -alm. !
  - *pinnatifidum* (Fliget Høgeurt) - 1965: præstegårdsplantagen (Øllg.)
  - *umbellatum* (Smalbladet Høgeurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
  - *vulgatum* (Alm. Høgeurt) - 1965: sydenden af Vestbjerge (Øllg.)
- Hippophaë rhamnoides* (Havtorn) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.) - bl.a. på strandvold ved færgelejet ved Venø Odde !
- Hippuris vulgaris* (Hestehale) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær (Øllg.)
- Holcus lanatus* (Fløjlgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- *mollis* (Krybende Hestegræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) ~ alm. !
- Honckenya peploides* (Strandarve) - 1955 - 1962 (AP) - 1965: m.alm. på stranden (Øllg.) alm. !
- Hordeum vulgare* inkl. var. *distichum* (Alm. Byg) 1965: forvildet (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Krasbjerg !
- Hydrocotyle vulgaris* (Vandnavle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde, syd for Firbjerg (Øllg.) - bl.a. i kær ved Vejsbjerg Gårde !
- Hypericum maculatum* (Kantet Perikon) - hedekær nordvest for Nørreknæk !
- *perforatum* (Prikbladet Perikon) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på vejkant nord for Nørreknæk !
  - *pulchrum* (Smuk Perikon) 1955, 1962 (AP) - 1965: Forstov Bakke, Hylbjerg Høj (Øllg.)
- Hypochoeris glabra* (Glat Kongepen) - 1955 (AP) - kornmarker ved Firbjerg !
- *radicata* (Alm. Kongepen) - 1955 (AP) - bl.a. i skov øst for Firbjerg !
- Iris* sp. (iris) - 1965: forvildet (Øllg.)
- Jasione montana* (Blåmunke) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Juncus articulatus* (Glanskapslet Siv) - 1955, 1962 (AP) -1965: alm. (Øllg.) bl.a. i hedekær ved Lillesig !
- *bufonius* (Tudse-Siv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !

- Juncus bulbosus* (Liden Siv) - 1965: Venø By, kær (Øllg.)
- *conglomeratus* (Knop-Siv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
  - *effusus* (Lyse-Siv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
  - *filiformis* (Tråd-Siv) - 1955~ 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) mose sydøst for Vejsbjerg Gårde !
  - *gerardi* (Harril) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *ranarius* (Klæg-Siv) - 1955 (AP)
  - *squarrosus* (Børste-Siv) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) bl.a. i hedekær ved Lillesig !
- Juniperus communis* (Ene) 1965: Forstov Bakke, syd for Krasbjerg (Øllg.)
- Knautia arvensis* (Blåhat) 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Lamium amplexicaule* (Liden Tvetand) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Torsodde, Hylbjerg Høj (Øllg.) - mark ved Ørbjerg !
- *hybridum* (Fliget Tvetand) - 1965: alm. (Øllg.) - kartoffelmark øst for Forstov Bakke !
  - *purpureum* (Rød Tvetand) - 1955 (AP) - bl.a. på overdrev ved Nørreris !
- Lapsana communis* (Haremad) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i skovkant vest for Sønderris !
- Larix kaempferi* (Japansk Lærk) - 1965: plantet (Øllg.) - Venø Plantage !
- Lathyrus japonicus* ssp. *acutifolius* (Klit-Fladbælg) - 1955 (AP) - 1965: flere steder ved kysten (Øllg.)
- *montanus* (Krat-Fladbælg) - 1965: Forstov Bakke, Firbjergsande (Øllg.) - bl.a. på Forstov Bakke !
- Lemna minor* (Liden Andemad) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd for Firbjergsande, Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde (Øllg.) - bl.a. i vandhul i plantage nord for Sønderdskov !
- Leontodon autumnalis* (Høst-Borst) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i skovkant vest for Sønderris !
- Lepidium ruderae* (Stinkende Karse) - 1965: Venø Odde (Øllg.)
- Leucanthemum vulgare* (Hvid Okseøje) - 1955 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Krasbjerg !
- Leymus arenarius* (Marehalm) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. på stranden (Øllg.) alm. !
- Linaria vulgaris* (Alm. Torskemund) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Linum catharticum* (Vild Hør) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
- *usitatissimum* (Alm. Hør) - majsmark ved Nørskov !
- Littorella uniflora* (Strandbo) - 1914 (KW)
- Lolium multiflorum* (Italiensk Rajgræs) - 1965: sydenden af Vejsbjerg (Øllg.)
- *perenne* (Alm. Rajgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *remotum* (Hør-Rajgræs) - 1955: Serradelmark (AP)
  - *rigidum* (Ru Rajgræs) - 1955: Serradelmark (AP)
  - *temulentum* (Giftig Rajgræs) - 1955: Serradelmark (AP)
- Lonicera periclymenum* (Alm. Gedeblad) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. i plantagerne (Øllg.) - bl.a. i Venø Plantage !
- Lotus corniculatus* (Alm. Kællingetand) - 1955 (AP) 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Lunaria annua* (Judaspunge) - krat ved Hylbjerg Gård !
- Lupinus luteus* (Gul Lupin) - 1965: dyrket og forvildet (Øllg.)
- *polyphyllus* (Mangebladet Lupin) - bl.a. på hede ved Vejsbjerg Gårde !
- Luzula campestris* (Mark-Frytle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !

- Luzula multiflora* ssp. *multiflora* (Mangeblomstret Frytle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. i heder (Øllg.) - bl.a. i hede nord for Lillesig !
- *pilosa* (Håret Frytle) - 1965: Forstov Bakke (Øllg.)
- Lychnis flos-cuculi* (Trævlekrone) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.) - hedekær nord for Lillesig !
- Lycium barbarum* (Bukketorn) - Venø By !
- Lycopus europaeus* (Sværtelvæld) - 1955 (AP) - 1965: Vejsbjerg Gårde (Øllg.) - mose ved Vejsbjerg Gårde !
- Lysimachia nummularia* (Pengebladet Fredløs) - 1965: dyrket Venø By (Øllg.)
- *punctata* (Prikbladet Fredløs) - 1965: forvildet Venø By (Øllg.)
- Majanthemum bifolium* (Majblomst) - 1965: Forstov Bakke (Øllg.) - krat ved kirken !
- Malus x domestica* (Sød Æble) - 1965: forvildet (Øllg.) bl.a. på overdrev ved Stodbjerg !
- Malva moschata* (Moskus-Katost) - 1955 (AP) - 1965: Venø By, Skånbjerg (Øllg.)
- *pusilla* (Liden Katost) - 1914 (KW) - 1955, 1962 (AP)
- *sylvestris* (Alm. Katost) - 1955, 1962 (AP) - 1965: havnen (Øllg.) bl.a. på vejkant i Venø By !
- Medicago lupulina* (Humble-Sneglebælg) - 1955 (AP) - 1965: Skånbjerg (Øllg.)
- *sativa* (Lucerne) - 1955 (AP) - 1965: Skånbjerg (Øllg.)
- Mentha aquatica* (Vand-Mynte) - 1955 (AP)
- *arvensis* (Ager-Mynte) - 1965: Vejsbjerg Gårde, Venø By, kær (Øllg.)
- Menyanthes trifoliata* (Bukkeblad) - 1962 (AP)
- Molinia coerulea* (Blåtop) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret alm. (Øllg.) - bl.a. i hedekær nord for Lillesig !
- Myosotis arvensis* (Mark-Forglemmigej) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- *laxa* ssp. *caespitosa* (Sump-Forglemmigej) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
- *sylvatica* (Skov-Forglemmigej) - 1965: præstegården (Øllg.)
- Myosurus minimus* (Musehale) - hedekær ved Lillesig !
- Narcissus poëticus* (Pinselilje) - Venø By !
- *pseudonarcissus* (Påskelilje) - overdrev ved Møgelsig !
- Nardus stricta* (Katteskæg) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i hedekær ved-Røn-kjær !
- Narthecium ossifragum* (Benbræk) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
- Odontites verna* ssp. *pumila* (Sommer-Rødtop) - 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på strandeng ved Nørskov Vig !
- - ssp. *serotina* (Høst-Rødtop) - 1955 (AP)
- Oenothera biennis* (Toårig Natlys) - 1965: dyrket (Øllg.)
- Ophioglossum vulgatum* (Slangetunge) - 1965: Røn-kjær (Øllg.)
- Ornithopus perpusillus* (Liden Fugleklo) - 1955: dyrket mark (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
- *sativus* (Serradel) --1955: dyrket mark (AP)
- Oxycoccus palustris* (Tranebær) - 1955 (AP)
- Papaver argemone* (Kølle-Valmue) - skrænt ved Krasbjerg !
- *dubium* (Gærde-Valmue) - 1965: Krasbjerg (Øllg.) bl.a. i lavning vest for Stodbjerg !
- *somniferum* (Opium-Valmue) - 1965: præstegården (Øllg.)
- Parnassia palustris* (Leverurt) - 1962 (AP)
- Pastinaca sativa* (Pastinak) - 1955, 1962 (AP) - 1965: forvildet Venø By (Øllg.) vejkant mellem Byen og havnen !
- Pedicularis palustris* ssp. *palustris* (Eng-Troldurt) - 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)

- Pedicularis sylvatica* (Mose-Troldurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde (Øllg.) - hedemose ved Vejsbjerg Gårde !
- Peplis portula* (Vandportulak) - 1962 (AP) - 1965: lavning ved Risbjerg (Øllg.)
- Phleum bertolonii* (Knold-Rottehale) - 1955, 1962 (AP) - skrænt ved Nørreris !
- *pratense* (Eng-Rottehale) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Phragmites australis* (Tagrør) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i kær sydøst for Vejsbjerg Gårde !
- Picea abies* (Rødgran) - 1965: plantet (Øllg.)
- *glauca* (Hvidgran) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - alm. !
- *sitchensis* (Sitka-Gran) - 1965: plantet (Øllg.) - alm. !
- Pimpinella saxifraga* (Alm. Pirnpinelle) 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -alm. !
- var. *nigra* (Sort Pimpinelle) -1965 - Risbjerg, Firbjergsande og Hylbjergløv (Øllg.)
- Pinus contorta* (Klit-Fyr) - 1965: plantet (Øllg.)
- *mugo* (Alm. Bjerg-Fyr) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - bl.a. i skov ved Stodbjerg !
- *nigra* var. *austriaca* (Østrigsk Fyr) - krat ved Møgelsig !
- *sylvestris* (Skov-Fyr) - bl.a. i skov ved Stodbjerg !
- Plantago coronopus* (Fliget Vejbred) - 1914 (KW) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Tors Odde (Øllg.)
- *lanceolata* (Lancet Vejbred) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- *major* ssp. *intermedia* - vejkant ved Sønderskov !
- ssp. *major* (Glat Vejbred) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- *maritima* (Strand-Vejbred) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Poa annua* (Enårig Rapgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
- *nemoralis* (Lund-Rapgræs) - Venø Plantage !
- *pratensis* (Eng-Rapgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) bl.a. på vejkant ved Nørreris !
- *subcoerulea* (Blågrøn Rapgræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på overdrev ved Venø By !
- *trivialis* (Alm. Rapgræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på vejkant ved Sønderskov !
- Polygala vulgaris* (Alm. Mælkeurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Forstov Bakke, Hylbjerg Høj (Øllg.)
- Polygonum amphibium* (Vand-Pileurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Lillesig, Venø By, kær, og flere steder (Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
- *aviculare* ssp. *aequale* (Småbladet Vej-Pileurt) - 1955 (AP) - 1965: Venø Odde (Øllg.)
- ssp. *aviculare* (Alm. Vej-Pileurt) 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
- *convolvulus* (Snerle-Pileurt) - 1955, 1962 (AP) 1965: alm. (HØ) - alm. !
- *cuspidatum* (Japan-Pileurt) - hegn ved Nørskov !
- *lapathifolium* ssp. *lapathifolium* (Knudet Pileurt) - 1955 (AP) -1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i kær ved Søndergård !
- *lapathifolium* ssp. *pallidum* (Bleg Pileurt) - 1955, 1962 (AP) alm. !
- *neglectum* (Spidsbladet Pileurt) - 1955 (AP)
- *persicaria* (Fersken-Pileurt) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) bl.a. på skrænt ved Nørreris !
- Polypodium vulgare* (Alm. Engelsød) - 1955 (AP) - 1965: alm. i heder (Øllg.) - bl.a. i Venø Plantage !

- Populus alba* (Sølv-Poppel) - 1965: plantet (Øllg.)
- *x berolinensis* (Berliner-Poppel) - 1965: plantet (Øllg.)
  - *x canadensis* cv. *serotina* (Landevejs-Poppel) - 1965: plantet (Øllg.)
  - *x candicans* (Ontarisk Poppel) - 1965: plantet (Øllg.) - Venø Plantage !
  - *tremula* (Bævreasp) - 1965: Risbjerg (Øllg.)
- Potamogeton alpinus* (Rust-Vandaks) - 1914 (KW)
- *natans* (Svømmende Vandaks) - 1965: grusgrav nord for Sønderskov (Øllg.)
  - *pectinatus* (Børstebledet Vandaks) 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.) - strandsø ved Tors Odde !
  - *perfoliatus* (Hjertebladet Vandaks) 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.)
  - *polygonifolius* (Aflangbladet Vandaks) - 1914 (KW) - 1955 (AP) - 1965: Rønkjær, Venø By, kær, nord for Sønderskov (Øllg.)
  - *pusillus* (Liden Vandaks) 1914 (KW) 1965: Rønkjær (Øllg.)
- Potentilla anserina* (Gåse-Potentil) 1955 (AP) 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- *argentea* ssp. *argentea* (Alm. Sølv-Potentil) - 1955 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. i ung grankultur ved Nørskov !
  - ssp. *demissa* (Glat Sølv-Potentil) - 1962 (AP) - Nørskov !
  - *erecta* (Tormentil) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *palustris* (Kragefod) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær, Vejsbjerg Gårde, Firbjerge (Øllg.) - bl.a. i kær ved Venø By !
- Primula veris* (Hulkrauet Kodriver) - krat ved Hylbjerggård !
- *vulgaris* (Storblomstret Kodriver) - 1955 (AP) - 1965: præstegården (Øllg.)
- Prunella vulgaris* (Alm. Brunelle) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Prunus avium* (Fugle-Kirsebær) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.)
- *cerasifera* (Mirabel) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.) - bl.a. i skovkant øst for Firbjerge !
  - *cerasus* (Sur-Kirsebær) - 1965: plantet og forvildet (Øllg.) - bl.a. i Venø Plantage !
  - *serotina* (Glansbladet Hæg) - hede ved Vejsbjerg Gårde !
- Puccinellia distans* (Udspærret Annelgræs) - 1965: Østerøre (Øllg.)
- *maritima* (Strand-Annelgræs) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. på strandene (Øllg.) - strandeng ved Nørskov Vig !
- Pyrola minor* (Liden Vintergrøn) - 1965: præstegårdsplantagen (Øllg.) - Venø Plantage !
- Pyrus communis* (Pære) - skoven ved Venø By !
- Quercus robur* (Stilk-Eg) - 1965: plantet og selvsået (Øllg.) - bl.a. i Venø Plantage !
- Radiola linoides* (Tusindfrø) - 1955, 1962 (AP) 1965: syd for Firbjergsande (Øllg.). mose ved Vejsbjerg Gårde !
- Ranunculus acris* (Bidende Ranunkel) - 1955 (AP) 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i kær sydvest for Vejsbjerg Gårde !
- *bulbosus* (Knold-Ranunkel) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Firbjerge (Øllg.) bl.a. på overdrev ved Venø By !
  - *flammula* (Kær-Ranunkel) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) bl.a. i kær ved Venø By !
  - *repens* (Lav Ranunkel) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *sceleratus* (Tigger-Ranunkel) - 1955, 1962 (AP) - 1965: kysten ved Nørreris (Øllg.) - strandbred syd for havnen !
- Raphanus raphanistrum* (Kiddike) - 1955, 1962 (AP) - 1965: syd for Sønderskov (Øllg.)
- *sativus* (Radis) ærtemark ved Forstov Bakke !
- Reseda lutea* (Gul Reseda) 1962 (AP)

- Rheum rhabarbarum* (Rabarber) - vejkant i Venø By !
- Rhinanthus minor* (Liden Skjaller) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Rønkjær (Øllg.) - overdrev ved Venø By !
- Ribes nigrum* (Solbær) - 1965: forvildet (Øllg.)
- *rubrum* ssp. *sylvestre* (Have-Ribs) - 1965: forvildet (Øllg.) - bl.a. i plantage ved Havstokken !
  - *uva-crispa* (Stikkelsbær) - 1965: forvildet (Øllg.) - bl.a. i skov vest for Venø By !
- Rosa canina* ssp. *canina* (Glat Hunde-Rose) - 1965: hist og her (Øllg.)
- *dumalis* ssp. *coriifolia* (Håret Blågrøn Rose) - bl.a. ved mose nordvest for Søndergård !
  - ssp. *dumalis* (Glat Blågrøn Rose) - hegn ved Sønderskov !
  - *rugosa* (Rynket Rose) - 1962 (AP) - 1965: alm. på stranden (Øllg.) - alm. !
- Rubus allegheniensis* (Brombær, sect. *Rubus*) - Venø Plantage !
- *armeniacus* (Brombær, sect. *Rubus*) - 1965: Venø By (Øllg.) - bl.a. i krat nord for Nørby !
  - *caesius* (Korbær) - 1965: Vejsbjerg Gårde (Øllg.)
  - *camptostachys* (Hassel-Brombær, sect. *Corylifolii*) plantage ved Havstokken !
  - *idaeus* (Hindbær) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *infestus* (Brombær, sect. *Rubus*) - krat ved Øster Nørskov !
  - *laciniatus* (Brombær, sect. *Rubus*) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *plicatus* (Brombær, sect. *Rubus*) - 1965: syd for Sønderskov (Øllg.) - bl.a. i hegn ved Lillesig !
  - *pyramidalis* (Brombær, sect. *Rubus*) - 1983: Forstov Bakke (Øllg.) - bl.a. i plantage ved Havstokken !
  - *radula* (Brombær, sect. *Rubus*) - 1983: Forstov Bakke (Øllg.) - i krat ved Nørskov !
  - *sciocharis* (Brombær, sect. *Rubus*) - 1983: Forstov Bakke (Øllg.) - bl.a. i plantage ved Havstokken !
  - *spectabilis* (Laksebær) - Venø Plantage !
  - *wahlbergii* (Hassel-Brombær, sect. *Corylifolii*) - 1983: Forstov Bakke (Øllg.) bl.a. i skov ved Nørskov !
- Rumex acetosa* (Alm. Syre) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- *acetosella* (Rødknæ) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *crispus* (Kruset Skræppe) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *hydrolapathum* (Vand-Skræppe) - mose ved Vejsbjerg Gårde !
  - *longifolius* (By-Skræppe) - 1962 (AP)
  - *obtusifolius* (Butbladet Skræppe) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ved kirken (Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
  - *thyrsiflorus* (Dusk-Syre) - 1962 (AP)
- Sagina apetala* (Kronløs Firling) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.)
- *maritima* (Strand-Firling) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ved Nørskov Vig (Øllg.)
  - *nodosa* (Knude-Firling) - 1965: hist og her på strandvolde på vestkysten (Øllg.) - strandoverdrev ved Venø Odde !
  - *procumbens* (Alm. Firling) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm- !
  - *subulata* (Syl-Firling) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. ved vestkysten, Hylbjerg Høj (Øllg.)
- Salicornia europaea* (Alm. Salturt) - 1965: strandenge, alm. (Øllg.) bl.a. på strandeng ved Bradser Odde !
- *ramosissima* (Kortakset Salturt) 1962 (AP) strandenge ved Nørskov Vig !

- Salix acutifolia* (Kaspisk Pil) - hegn ved Hylbjerg Gård !
- *arenaria* (Gråris) - 1965: Rønkjær (Øllg.) - alm. !
  - *aurita* (Øret Pil) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. i kær ved Venø By!
  - *caprea* (Selje-Pil) - 1965: nord for Vejsbjerg Gårde og Forstov Bakke (Øllg.) - bl.a. i kær vest for Stodbjerg !
  - *cinerea* (Gråpil) - 1955 (AP) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.) - bl.a. i mose sydøst for Vejsbjerg Gårde !
  - *fragilis* (Skørpil) - 1965: plantet (Øllg.)
  - *x pentandra* - 1965: plantet (Øllg.)
  - *pentandra* (Femhannet Pil) - hegn ved Hylbjerg Gård !
  - *purpurea* (Purpurpil) - 1965: plantet (Øllg.)
  - *repens* (Krybende Pil) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
  - *x rubens* (Grøn Pil) - 1965: plantet (Øllg.)
  - *x smithiana* (Lancet-Pil) - hegn mellem Nørremose og Hylbjerg Gård !
  - *viminalis* (Bånd-Pil) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. på hede øst for Firbjerge !
  - *x caprea* - 1965: plantet (Øllg.)
- Salsola kali* ssp. *kali* (Alm. Sodaurt) - 1955, 1962 (AP)
- Sambucus nigra* (Alm. Hyld) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- *racemosa* (Drue-Hyld) - bl.a. i plantage sydvest for Stenkast !
- Saponaria officinalis* (Alm. Sæbeurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By (Øllg.) - bl.a. på vejkant i Venø By !
- Sarothamnus scoparius* (Gyvel) - 1955 (AP) - 1965: Venø By (Øllg.) - bl.a. på hede ved Firbjergsande !
- Saxifraga granulata* (Kornet Stenbræk) - 1965: Hylbjerg Gård, syd for Sønderskov (Øllg.) bl.a. på skrænt nordvest for Nørskov !
- Scilla non-scripta* (Klokke-Skilla) overdrev ved Møgelsig !
- Scirpus maritimus* (Strand-Kogleaks) 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i hedekær ved Lillesig !
- *tabernaemontani* (Blågrøn Kogleaks) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret almindelig (Øllg.) - bl.a. i kær ved skov vest for Stodbjerg !
- Scleranthus annuus* ssp. *annuus* (Enårig Knavel) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - mark ved Stodbjerg !
- *perennis* (Flerårig Knavel) - 1955 (AP)
- Scorzonera humilis* (Lav Skorsoner) - 1965: syd for Krasbjerg, Forstov Bakke, Stenkast, nord for Sorthøj (Øllg.) - Vejsbjerge !
- Scrophularia nodosa* (Knoldet Brunrod) - 1962 (AP) - skrænt ved Nørskov !
- Sedum acre* (Bidende Stenurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
- *album* (Hvid Stenurt) - 1965: havnen (Øllg.)
  - *spuri* (Rød Stenurt) - 1965: havnen, kirkediget (Øllg.)
  - *telephium* ssp. *maximum* (Alm. Sct. Hansurt) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By (Øllg.) - bl.a. på vejkant i Venø By !
- Senecio sylvaticus* (Skov-Brandbæger) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - alm. !
- *vernalis* (Vår-Brandbæger) - 1955, 1962 (AP) - 1965: østkysten (Øllg.) bl.a. på overdrev øst for Firbjerge !
  - *viscosus* (Klæbrig Brandbæger) - 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. ved kysten (Øllg.) - alm. ved kysten !
- Senecio vulgaris* (Alm. Brandbæger) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Sherardia arvensis* (Blåstjerne) - 1955, 1962 (AP)

- Sieglingia decumbens* (Tandbælg) - 1955, 1962 (AP) 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
- Silene alba* (Aften-Pragtstjerne) - 1955 (AP) - 1965: Skånbjerg, syd for Venø By (Øllg.) - bl.a. på mark ved Vejsbjerg Gårde !
- *dioica* (Dag-Pragtstjerne) - 1965: Hylbjerg Gård (Øllg.) - hegn vest for Nørskov !
  - *gallica* (Fransk Limurt) - 1955: Serradelmark (AP)
  - *maritima* (Strand-Limurt) - 1914 (KW) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. ved vestkysten (Øllg.) - bl.a. på stranden ved havnen !
  - *noctiflora* (Nat-Limurt) - 1965: Venø Odde og Skånbjerg (Øllg.)
  - *vulgaris* ssp. *vulgaris* (Blæresmælde) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. i skovlysning i Venø Plantage !
- Sinapis alba* (Gul Sennep) - vejkant ved Nørskov !
- *arvensis* (Ager-Sennep) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. ved grøft ved Rønkjær !
- Sisymbrium officinale* (Rank Vejsennep) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
- Solanum dulcamara* (Bittersød Natskygge) - bl.a. i skov ved Stodbjerg !
- *nigrum* ssp. *nigrum* (Sort Natskygge) - 1965: ukrudt (Øllg.)
  - *tuberosum* (Kartoffel) - 1965: forvildet (Øllg.) - affaldshenkastning på stranden ved Nørskov !
- Solidago virgaurea* (Alm. Gyldenris) - 1962 (AP) - 1965: Forstov Bakke (Øllg.) - overdrev nordøst for Nørskov !
- Sonchus arvensis* (Ager-Svinemælk) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- *asper* (Ru Svinemælk) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) bl.a. i hegn ved Sønderskov !
  - *inermis* (Glat Svinemælk) - 1955 (AP)
  - *oleraceus* (Alm. Svinemælk) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
- Sorbaria sorbifolia* (Tusindtop) - Venø Plantage !
- Sorbus aucuparia* (Alm. Røn) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) -alm. !
- *intermedia* (Selje-Røn) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. i plantage vest for Stodbjerg !
- Sparganium emersum* (Enkelt Pindsvineknop) - 1965: grusgrave nord for Sønderskov (Øllg.)
- Sparganium erectum* s.lat. (Grenet Pindsvineknop) - 1965: grusgrave nord for Sønderskov (Øllg.)
- Spergula arvensis* (Alm. Spergel) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- var. *sativa* - 1955, 1962 (AP)
- Spergularia marina* (Kødet Hindeknæ) - 1955, 1962 (AP) - 1965: strandenge, alm. (Øllg.) - Nørskov Vig !
- *media* (Vingefrøet Hindeknæ) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ved Nørskov Vig (Øllg.) - Nørskov Vig !
  - *rubra* (Mark-Hindeknæ) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Øster Nørskov, syd for Firbjerge, nord for Sønderskov (Øllg.) - strandoverdrev ved Krasbjerg !
- Spiraea salicifolia* (Pilebladet Spiræa) - 1965: plantet (Øllg.)
- Stachys palustris* (Kær-Galtetand) - 1965: syd for Firbjerge, Vejsbjerg Gårde, syd for Sønderskov (Øllg.) - bl.a. i kær nord for Stodbjerg !
- Stellaria graminea* (Græsbladet Fladstjerne) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. i kær ved Venø By !
- *media* (Alm. Fuglegræs) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
- Suaeda maritima* (Strandgäsefod) - 1962 (AP) - 1965: alm. på strandenge (Øllg.) - Nørskov Vig !



- Succisa pratensis* (Djævelsbid) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ret alm. (Øllg.) - bl.a. på skrænt nord-vest for Firbjerg !
- Symphoricarpos rivularis* (Alm. Snebær) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. på skrænt ved Nørreris !
- Symphytum orientale* - 1955: Serradelmark (AP)
- *x uplandicum* (Foder-Kulsukker) - 1965: Nørreris (Øllg.) - bl.a. på vejkant ved Hylbjerg Gård !
- Syringa vulgaris* (Syren) - 1965: plantet (Øllg.) bl.a. i hegn ved Vejsbjerg Gårde !
- Tanacetum parthenium* (Matrem) - 1965: forvildet ved Hylbjerg Gård (Øllg.)
- *vulgare* (Rejnfan) - 1955, 1962 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på vejkant ved Møgelsig !
- Taraxacum*, sect. *Erythrosperma*, (Rødfrugtet Sand-Mælkebøtte):
- Taraxacum brachyglossum*
- *distendens*
  - *frondornatum*
  - *fulvum*
  - *limbatum*
  - *proximum*
  - *wessbergii*
- Taraxacum*, sect. *Obliqua* (Gråfrugtet Sand-Mælkebøtte):
- Taraxacum platyglossum*
- Taraxacum*, sect. *Spectabilia* (Nordisk Mælkebøtte):
- Taraxacum cimbricum*
- Taraxacum*, sect. *Celtica* (Eng-Mælkebøtte):
- Taraxacum duplidentifrons*
- *gelertii*
- Taraxacum*, sect. *Naevosa* (Plettet Mælkebøtte):
- Taraxacum euryphyllum*
- Taraxacum*, sect. *Hamata* (Krogfliget Mælkebøtte):
- Taraxacum boekmanii*
- *hamatiforme*
  - *lamprophyllum*
  - *polyhamatum*
  - *subhamatum*
- Taraxacum*, sect. *Ruderalia* (Fandens Mælkebøtte):
- Taraxacum acroglossum*
- *aequilobum*
  - *alatum*
  - *ancistrolobum*
  - *angustisquameum*
  - *auriculatum*
  - *caloschistum*
  - *cordatum*
  - *croceiflorum*
  - *dahlstedtii*
  - *dilaceratum*
  - *dilatatum*
  - *diversilobum*
  - *ekmanii*

*Taraxacum fasciatum*

- *haematicum*
- *hemicyclum*
- *intermedium*
- *lacinosifrons*
- *laeticolor*
- *latissimum*
- *leptaleum*
- *leucopodium*
- *lingulatum*
- *lunare*
- *obliquilobum*
- *obtusulum*
- *ostenfeldii*
- *pallescens*
- *pallidipes*
- *pannucium*
- *pannulatum*
- *pectinatiforme*
- *polyodon*
- *porrigens*
- *pseudoretroflexum*
- *pulcherrimum*
- *pulverulentum*
- *purpureum*
- *recurvum*
- *rhodopodium*
- *sagittipotens*
- *sellandii*
- *stereodes*
- *subbaurosulum*
- *subcanescens*
- *subdahlstedtii*
- *sublaeticolor*
- *subleucopodium*
- *tenebricans*
- *valens*
- *vastisectum*
- *xanthostigma*

*Taxus baccata* (Taks) - Venø Plantage !

*Teesdalia nudicaulis* (Flipkrave) - 1955, 1962 (AP) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.) - bl.a. på udyrket mark øst for Firbjerg !

*Thlaspi arvense* (Alm. Pengeurt) 1965: ukrudt flere steder (Øllg.) - bl.a. på vejkant i Venø By !


*Thymus serpyllum* (Smalbladet Timian) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på overdrev ved Sønderskov !

*Tilia cordata* (Småbladet Lind) - Venø Plantage !

*Tragopogon pratensis* (Eng-Gedeskæg) - 1965:-Venø By (Øllg.)

- Tragopogon pratensis* ssp. *minor* (Småkronet Gedeskæg) - bl.a. i Venø Plantage !
- Trichophorum caespitosum* ssp. *germanicum* (Vestlig Tue-Kogleaks) - 1965: nord for Sorthøj (Øllg.)
- Trientalis europaea* (Skovstjerne) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Forstov Bakke, Vejsbjerg (Øllg.) - bl.a. på hede ved Majbjerg !
- Trifolium arvense* (Hare-Kløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) alm. !
- *carmpestre* (Gul Kløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) bl.a. på mark nordøst for Firbjerg !
  - *dubium* (Fin Kløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *fragiferum* (Jordbær-Kløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. på strandenge (Øllg.) - Nørskov Vig !
  - *hybridum* ssp. *hybridum* (Alsike-Kløver) - 1955 (AP) - 1965: nord for Sønderskov (Øllg.) - skovkant ved Stodbjerg !
  - *incarnatum* (Blod-Kløver) - 1914 (KW)
  - *medium* (Bugtet Kløver) - 1955 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. på mark vest for Stodbjerg !
  - *ochroleucum* (Bleggul Kløver) - 1955: Serradelmark (AP)
  - *pratense* (Rødkløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - bl.a. på strandoverdrev ved Arkbjerg !
  - *repens* (Hvidkløver) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *striatum* (Stribet Kløver) - 1955 (AP) - 1965: Hylbjerg Gård, Ørbjerg og syd for Nørskov (Øllg.)
- Triglochin maritimum* (Strand-Trehage) - 1955, 1962 (AP) - 1965: strandenge (Øllg.) - bl.a. på strandenge ved Nørskov Vig !
- *palustre* (Kær-Trehage) - 1955, 1962 (AP) - 1965: væld og moser, hyppig (Øllg.) - bl.a. i tagrørsump ved Rønkjær !
- Tripleurospermum inodorum* (Lugtløs Kamille) 1965: ukrudt, hist og her (Øllg.) - alm. !
- *maritimum* ssp. *maritimum* (Krusbladet Strandkamille) - Bot. Tidsskr. 59, 1963
  - - ssp. *salinum* (Alm. Strandkamille) - 1962 (AP) - 1965: stranden (Øllg.) - bl.a. på stranden ved Venø Odde !
- Triticum aestivum* (Hvede) - bl.a. på skrænt ved Møgelsig!
- Tussilago farfara* (Følfod) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. på stranden (Øllg.) bl.a. på stenet strandvold ved Møgelsig !
- Typha latifolia* (Bredbladet Dunhammer) - 1965: mose ved Vejsbjerg Gårde (Øllg.) mose ved Vejsbjerg Gårde !
- Ulmus carpiniifolia* (Småbladet Ælm) - 1965: plantet (Øllg.)
- *glabra* (Skov-Ælm) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i krat ved Sønderskov !
- Urtica dioica* (Stor Nælde) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.) - bl.a. i mose ved Vejsbjerg Gårde !
- *urens* (Liden Nælde) - 1955 (AP) - 1965: ryddepladser og haver (Øllg.) - mark ved Nørskov !
- Vaccinium myrtillus* (Blåbær) - bl. a. på overdrev nordøst for Nørskov !
- *uliginosum* (Mose-Bølle) - 1955, 1962 (AP) - 1965: temmelig alm. i hede (Øllg.) - bl.a. i kær sydvest for Vejsbjerg Gårde !
- Valeriana sambucifolia* ssp. *procurrens* (Alm. Baldrian) - 1965: syd for Firbjerg Sande (Øllg.) markskel ved Rønkjær !
- Valerianella locusta* (Tandfri Vårsalat) - 1955 (AP) - bl.a. ved grøft ved Rønkjær !
- Verbascum densiflorum* (Uldbladet Kongelys) - 1965: flere steder ved haver (Øllg.)

- Verbascum thapsus* (Filtbladet Kongelys) - 1955, 1962 (AP) - bl.a. på skrænt ved Nørreris !
- Veronica agrestis* (Flerfarvet Ærenpris) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - hegn ved Sønderskov !
- *arvensis* (Mark-Ærenpris) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.) - alm. !
  - *filiformis* (Plæne-Ærenpris) - 1965: Venø By, plæne (Øllg.)
  - *longifolia* (Langbladet Ærenpris) - 1965: Venø By, ryddeplads (Øllg.)
  - *officinalis* (Læge-Ærenpris) - 1955 (AP) - 1965: hist og her (Øllg.) - bl.a. på hede Øst for Firbjerge !
  - *persica* (Storkronet Ærenpris) - 1955, 1962 (AP) - 1965: ukrudt enkelte steder (Øllg.) bl.a. i mark vest for Stodbjerg !
  - *persica* var. *corrensiana* - 1955 (AP)
  - *scutellata* (Smalbladet Ærenpris) - 1955, 1962 (AP) - 1965: Venø By, kær
  - *serpyllifolia* (Glat Ærenpris) - 1955 (AP) - 1965: Hylbjerg Gård, nord for Sønder- skov (Øllg.) - bl.a. i hedekær øst for Firbjerge !
- Viburnum opulus* (Kvalkved) - bl.a. i skov ved Stodbjerg !
- Vicia angustifolia* (Smalbladet Vikke) - 1955 (AP) - 1965: alm. (Øllg.)
- - var. *segetalis* - 1955, 1962 (AP)
  - *cracca* (Muse-Vikke) - 1965: alm. - alm. !
  - *hirsuta* (Tofrøet Vikke) - 1955 (AP) - 1965: temmelig alm. (Øllg.)
  - *lathyroides* (Vår-Vikke) - 1965: Hylbjerg Høj (Øllg.)
  - *sativa* (Foder-Vikke) - 1955 (AP) - 1965: dyrket (Øllg.) - vejkant ved Krasbjerg !
  - *tetrasperma* (Tadder-Vikke) - 1962 (AP) - flere steder i Venø Plantage !
  - *villosa* ssp. *villosa* (Sand-Vikke) - 1955 (AP)
- Vinca minor* (Liden Singrøn) - 1965: plantet (Øllg.) - bl.a. i krat ved Hylbjerg Gård !
- Viola arvensis* (Ager-Stedmoderblomst) - 1955, 1962 (AP) - 1965: hist og her i kornmarker (Øllg.) - alm. !
- *canina* (Hunde-Viol) - 1955, 1962 (AP) - 1965: m.alm., især på vestkystens skrænter (Øllg.) - bl.a. på lyngbakke ved Sønderskov !
  - *odorata* (Marts-Viol) 1955, 1962 (AP) - 1965: præstegården (Øllg.) bl.a. på vejkant ved Vejsbjerg Gårde !
  - *palustris* (Eng-Viol) - 1955, 1962 (AP) - 1965: de fleste ferskvandslokaliteter (Øllg.) - bl.a. i kær ved Venø By !
  - *tricolor* ssp. *tricolor* (Alm. Stedmoderblomst) - 1955 (AP) - 1965: alm., især på strandvolde (Øllg.) - alm. !
- Vulpia myurus* (Stor Væselhale) 1955: Serradelmark (AP)
- Zostera marina* (Alm. Ålegræs) 1962 (AP) - 1965: opskyl på stranden (Øllg.) - kysten ved Nørskov Vig !



Bredbægret Ensian (*Gentianella campestris* ssp. *campestris*) Der er kendt 3 Ensian-arter fra Venø: Bredbægret Ensian i Rønkjær og i kær syd for Firbjergsande, begge steder fundet af B. & H. Øllgaard i 1965. Eng-Ensian (*Gentianella uliginosa*) er fundet i kæret syd for Firbjergsande af B. & H. Øllgaard i 1965. Klokke-Ensian (*Gentiana pneumonanthe*) er set i 1955 og 1962 af Anfred Pedersen og i 1965 to steder af B. & H. Øllgaard: ved Vejsbjerg Gårde og i kær ved Venø By. Det gælder for alle 3 arter, at de ikke er set under mine ekskursioner fra 1985 til 1992. Det er muligt, at deres voksesteder på øen har forandret udseende.

### Tak

Universitetslektor Alfred Hansen, rådgivende biolog Bernt Løjtnant og seminarielektor Anfred Pedersen takkes for deres bemærkninger til manuskriptet. Alfred Hansen takkes desuden for bestemmelse eller verifikation af en række planteindsamlinger og Anfred Pedersen for hjælp i forbindelse med bestemmelse af *Atriplex*-, *Rosa* og *Rubus*-indsamlinger mv. Desuden takkes lærer Hans Øllgaard for hjælp i forbindelse med bestemmelse eller kontrol af alle *Taraxacum*-indsamlinger og Jens Chr. Schou for bestemmelse af *Hieracium*-indsamlingerne. Anfred Pedersen, Benjamin Øllgaard og Hans Øllgaard takkes, fordi jeg måtte benytte deres floralister.

Tegningerne er velvilligst stillet til rådighed af lærer Jens Chr. Schou, for hvilket han takkes på det bedste.

Ringkøbing Amtskommune, Landskabsafdelingen, takkes for økonomisk støtte i forbindelse med udarbejdelsen af denne ø-flora.

### Citeret litteratur

- Hansen, K. (red.), 1991: Dansk Feltflora, 5. opl. - København.
- Pedersen, A., 1961: Kurvblomsternes udbredelse i Danmark. - Bot. Tidsskr. 57: 81-289.
- 1963: Scrophulariaceernes og Orobanchaceernes udbredelse i Danmark. - Bot. Tidsskr. 59:1-140.
- 1968: Nogle kritiske, danske *Atriplex*-arter. - Bot. Tidsskr. 63: 289-303.
- 1974: Gramineernes udbredelse i Danmark. Spontane og naturaliserede arter. - Bot. Tidsskr. 68: 177-344.
- Pedersen, A. & J.C. Schou, 1989: Nordiske Brombær. - Århus.

### Forfatterens adresse:

Sandagervej 13  
Assentoft  
8900 Randers

# NATURGLIMT

## Bent Vestergaard Petersen

### VEJRET

September blev den varmeste nogensinde med temperaturer først på måneden nogle dage op til 25 grader. Gennemsnittet for måneden blev 16,2 grader. Sidst i måneden blev det dog mere efterårsagtigt med en hel del regn, men hæderlige temperaturer omkring 15 grader. I oktober blev det mere efterår med den første nattefrost i Midtjylland først i måneden. Oktober blev dog også varm og solrig med et gennemsnit på 9,6 grader – det varmeste i de sidste 30 år – og 1/3 mere sol end normalt. Den første sne faldt som sædvanlig midt i november.

### BOTANIK

#### Århus Havn

Om den varme eftersommer har betydning vides ikke, men der blev i hvert fald gjort en lang række interessante plantefund på Århus Havn i eftersommeren. Havnearealer og andre ruderaer er gode at besøge i september-oktober og man kan herved forlænge feltsæsonen og virkelig få set noget nyt. De fleste af de eksotiske arter kommer til havnen under aflæsning af sojafrø fra USA. Det er arealerne omkring Multiterminalen og Oliemøllen, der er de mest givtige. Her blot et lille udvalg af de mest spændende fra Multiterminalen: Blågrøn Skærmaks, Fabers Skærmaks, Amerikansk Hejre (*Bromus wildenowii*), Udspærret Hejre (*Bromus*

*squarrosus*), Bynke-Ambrosie, Trefliget Ambrosie, Klaseurt (*Iva xanthiifolia*) – en buskagtig kurvblomst, Bastard-Sennep (*Hirschfeldia incana*), Småhaget Pigrø, Top-Amarant, Opret Amarant, Alm. Hirse, Alm. Hanespore, Kongekommen, Rank Gåsefod, Skræppe-Brodfrø, Stivhåret Vej-sennep, Russisk Sodaurt, Ager-Rævehale, Kinajute, Sommercypres, Vild Durra og *Artemisia scoparia* – døbt Grenet Bynke – kun fundet 7 gange i DK. De fleste af arterne blev fundet indenfor hegnet, men også udenfor kan der gøres fund.

Flere af arterne stammer oprindeligt fra Sydeuropa eller Asien, men er først indslæbt til USA og derefter slæbt videre til Århus Havn. Interessant blev der også fundet Vingepileurt, der her må have en indslæbt forekomst, da den jo er vildtvoksende i Danmark.

I vejkanter og langs sporene ved Oliemøllen blev der bl.a. fundet: Blodhirse, Sojabønne, Pensylvansk Pileurt, Purpur-Tragtsnerle, Småblomstret Katost og Glatbladet Hirse. Andre steder er der fundet Rapunsel-Klokke – en sjælden art, der er ny for TBU 21.

#### Århus Banegård

Også arealerne omkring jербaneterrænet i Århus kan fremvise eksotiske arter. I sensommeren blev der således fundet Liden Fingeraks og Liden Kærlighedsgræs, der begge er vildtvoksende i Sydeuropa.

### Nyt fra AFD-undersøgelsen:

I et Naturglimt fra 1998 blev nævnt et fund af den sjældne Klokke-Vintergrøn i Skåde Skov syd for Århus. Det har nu vist sig at iblandet presset materiale indsendt til AFD-sekretariatet var der fra samme lokalitet eksemplarer af den nærtstående art Grønlig Vintergrøn. Begge arter er sjældne i DK og nye for TBU-distrikt 21.

Af andre nyheder fra det østjyske kan nævnes Liden Guldstjerne og Tandrod i Boller Skov samt Børste-Kogleaks på en nordvendt fugtig strandskrænt ved Boller Strand.

## SVAMPE

### Silkeborg-skovene

Et sensationelt svampefund er gjort ved Borres sø ved Silkeborg, nemlig Skællet Fåreporesvamp (*Albatrellus pes-caprae*). Den regnes for akut truet (E) i Danmark. Arten er sjælden overalt og dette fund var blot det andet i Skandinavien. Den er for øvrigt tidligere set ved Almind Sø i 1977. Skællet Fåreporesvamp er knyttet til gammel bøgeskov på morbund.

De to, relativt sjældne træboende pigsvampe Koral-Pigsvamp og Pighud blev fundet 13.11 ved Knagerne, Silkeborg Vesterskov, kendt lokalitet for begge arter.

20.10. blev Skællet Kødpigsvamp atter fundet i Hårup Sande. Den er sidst set der omkring 1986.

### Spredte fund

Den utroligt flotte Pindsvine-Pigsvamp har siddet hele november på en Bøg ved Ørnereden - eneste jyske lokalitet. En af grundene til at den har kunnet sidde i fred for svampesamlere er sikkert den, at den sidder i 10 meters højde!

11.11 blev der, også ved Ørnereden, fundet den meget sjældne Skærmhat, Skygge-Skærmhat på en kæmpe liggende bøgestamme. Det er en af de rigtigt gode gammelskopsindikatorer med kun ganske få jyske fund. Der er kun et gammelt fund fra

Århus-skovene uden præcis lokalitet eller år.


På ØBF's musetur blev der fundet en ny Parasolhat for Danmark, nemlig *Lepiota ignicolor*, som har fået foreslået navnet Ræverød Parasolhat. Fin, lille art, der sandsynligvis er en rigtig "varmeart". Desuden blev der fundet Bævrekeulle - et godt fund med kun ca 6 danske fund. Og dagen efter fandtes på samme lokalitet den lille sjældne posesvamp Musegrå Posesvamp og den tilsyneladende sjældne lav *Steinia geophana* på fugtig jord ved Lushage.

## DIVERSE

25.10: Skimmelflagermus høres zip-zip'ende ved Århus Universitet og ved Politistationen mellem 22.30 og 23.00.

Vil man vide noget mere om hvad der er gjort af spændende iagttagelser i Østjylland, kan det anbefales at besøge Vejle Amt på <http://www.vejleamt.dk/NATURMIL.NSF/Dokopslag/Naturpleje> samt Morten DD's hjemmesider:

<http://www.biology.au.dk/~biomddh/>



# Lægeiglens biologi og udbredelse i Danmark

**Tove Yde**

Lægeiglen (*Hirudo medicinalis*) er et sjældent dyr i Danmark og dens udbredelse er meget spredt. Om det er en oprindelig dansk art, ved vi faktisk ikke med sikkerhed, da der ikke er fundet fossiler, som kan bevise det. Der findes kun en art, men den vildtlevende, danske lægeigle ser lidt anderledes ud end den, der importeres fra Ungarn til brug ved plastikoperationer, demonstration på middelaldermarkeder m.v.

Iglerne er ledorme, ligesom f.eks. regnorme og sandorme. Igler (*Hirudinea*) omfatter i Danmark 14 kendte ferskvandsarter og et ukendt antal havigler. De fleste arter af ferskvandsigler lever på lavt vand i søer og damme.

## Kendetegn

Lægeiglen er en stor, kraftig igle, op til 15 cm lang, når den er udstrakt. Den lever udpræget i smådamme. Den vildtlevende, danske lægeigle tilhører en vesteuropæisk stamme, som også kaldes "den grå tyske". Den har en mørkt grønlig eller brunlig rygside med tydelige, gullige eller orange længdebånd og pletter. Bugsiden er grålig og marmorert. Den østeuropæiske stamme, som også kaldes "den grønne ungarske" har knap så tydelige længdestriber på rygside. Bugsiden er ensfarvet olivengrøn med en smal, sort stribe i hver side. Lægeiglen kan




Fig. 1. Bugsider af A: Lægeigle, den vesteuropæiske form, B: Lægeigle, den østeuropæiske form, og C: Hesteigle.

forveksles med hesteiglen, der er en meget almindelig ferskvandsigle i Danmark. Hesteiglen er ensfarvet grønsort på rygside og ensfarvet lys grålig på bugsiden, dog af og til med små, mørke pletter.

## Føde, forplantning og bevægelse

Lægeiglen lever udelukkende af blod. I naturen suger den især fra fisk og frøer, men også fra pattedyr, der f.eks. er i vandet for at drikke. Maven hos lægeiglen er forsynet



med elleve par blindsække, hvor blodet opbevares, og holdes friskt. Iglen behøver kun at spise med meget lange mellemrum. Ved et enkelt blodmåltid kan den forøge sin vægt flere gange, men kan så leve et år eller mere, inden den behøver suge igen.

Først når lægeiglen er fem år, er den kønsmoden. Ligesom alle andre iglearter, er den hermafrodit, hvert individ har både hanlige og hunlige kønsorganer. I juli kryber iglerne på land og graver en kokon med 5-15 æg ned i den fugtige jord. Otte uger senere forlader ungerne kokonen og søger ned til vandet.

Igler kan bevæge sig på to forskellige måder: de kan svømme og de kan krybe. Specielt for igler er, at en særlig muskulatur gør dem i stand til at ændre form -fra lange, tynde til korte, tykke. Alle igler har sugeskiver, en lille forrest og en større bagerst. Når lægeiglen svømmer, sker det med hurtige, bølgende /bugtende bevægelser. Iglen kryber, når den mærker et fast underlag. Det foregår ved, at den først fæster forreste sugeskive. Så gør den sig kort og tyk og hæfter bagerste sugeskive. Kroppen strækkes frem, forreste skive fæstes et nyt sted, hvorefter den bagerste skive slipper og trækkes frem bag den forreste.

### **Udbredelse i Europa**

Tidligere var lægeiglen udbredt og ret almindelig i det meste af Europa. I dag må arten betragtes som meget spredt forekommende, undtagen visse steder i Østeuropa, hvor den sandsynligvis stadig er forholdsvis almindelig. I dette århundrede er arten fundet i England, Holland, Tyskland, Polen, Estland, Finland, Sverige og Danmark (Birger Jensen, Flora og Fauna 1960). Efter 1960 er lægeiglen endvidere fundet på flere lokaliteter i Aust-Agder fylke i det sydlige Norge. De svenske fund stammer fra nogle få lokaliteter i Skåne, og på Öland og Gotland.

### **Udbredelse i Danmark**

I Danmark ser udviklingsmønsteret sådan ud, at lægeiglen var ret almindelig og

udbredt i 1800 tallet og i begyndelsen af 1900 tallet. I dag må den anses for at være et ret sjældent dyr her i landet. Kun på Bornholm er arten stadig almindelig.

Der er flere årsager til tilbagegangen. Overfiskning i 1800 tallet er nok hovedårsagen, men senere har opfyldning og tørlægning af smådamme begrænset antallet af egnede levesteder. Nedgang i antallet af græssende husdyr kan også have været medvirkende på nogle lokaliteter, da det kan have fjernet en del af fødegrundlaget.

En helt anden årsag til tilbagegangen i Danmark kan være, at den udbredelse, lægeiglen tidligere havde her i landet, muligvis ikke var helt naturlig. I 1800 tallet var forbruget af igler til medicinsk brug meget stort, allerede dengang importerede man dyr fra Ungarn. Udsætning af importerede dyr kan derfor godt have påvirket udbredelsen i Danmark i en periode. Dog ser det ud til, at rester efter eventuelle udsætninger nu er væk fra den danske bestand. Det ved vi, fordi den østeuropæiske form af lægeiglen ser anderledes ud end den vesteuropæiske. Alle fund af lægeigler i dansk natur i nyere tid kan henføres til den vesteuropæiske form. I "Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark" er lægeiglens status klassificeret som sårbar.

Udbredelseskortet med fund fra 1960-1999 viser 12 nyfund fra Bornholm. De er resultatet af en undersøgelse og registrering, som Pia Baagø foretog i 1983. Sandsynligvis har iglerne været på lokaliteterne længe, men er først blevet registreret ved undersøgelsen. Nyfundet fra Djursland er gjort af Bjarke Huus Jensen i 1991 i forbindelse med en registrering af løgfrø. Jeg har med held besøgt denne lokalitet flere gange i 1999. Nyfundet fra Klintholm på Fyn er gjort af Lars Briggs (Ole Fogh Nielsen, pers. medd.) indenfor de sidste par år.

Jeg har fået oplysninger om et par andre lokaliteter, bl.a. en i Østjylland, hvor der menes at være fundet lægeigle. Disse lokaliteter vil jeg undersøge i løbet af næste år.



Fig. 3. Lægeiglens udbredelse, fund fra 1900-1960.

Bornholm:	24	lokaliteter
Jylland:	7	-
Sjælland	9	-
Møn	1	-
Lolland	2	-
Falster	1	-



Fig. 4. Lægeiglens udbredelse, fund fra 1960-1999.

Bornholm:	36	lokaliteter
Jylland:	4	-
Sjælland	4	-
Møn	1	-
Lolland	1	-
Fyn	1	-

## Når iglen bider

Der findes flere blodsugende, danske igler, men lægeiglen er den eneste art, som er i stand til at bide igennem menneskehud. Den har tre kraftige kæber, som hver er besat med en række skarpe kalktænder. Når iglen bider, bevæges kæberne i en savende bevægelse, og der fremkommer et Y-formet snit. Spytkirtler på kæberne åbner sig og udskiller det antikoagulerende stof hirudin.

Når lægeiglen suger blod, f.eks. fra et menneske, gør det ikke ondt, for når den bider hul, bedøves bidstedet. Jeg er selv blevet bidt flere gange, og det er faktisk ikke spor ubehageligt. Mens blodsugeren arbejder, kan man se dens krop udføre en regelmæssig, pumpebevægelse. Iglen suger, indtil dens maveblindsække er fyldt, hvilket typisk tager ca. 30 minutter, og slipper så. Såret bløder op til et døgn efter biddet. Området omkring bidstedet bliver gult/blåt/sort, men misfarvningen forsvinder efter nogle dage. Ofte opstår der let kløe omkring såret.

De igler, som kan bestilles gennem de fleste apoteker, importeres fra Ungarn af medicinalfirmaet Unikem. Disse igler skulle efter firmaets udsagn være "rene", d.v.s., at sandsynligheden for at de kan overføre sygdomme anses for at være meget lille. Lader man sig bide af en lægeigle, er det vigtigt at sikre sig, at iglen ikke før har bidt andre mennesker, eller senere kommer til at bide andre.




Fig. 4. Tegning visende dels Lægeigle, dels iglens maveblindsække.

## Fangst af lægeigler

Det er min erfaring, at lægeigler ikke så let lader sig fange på normal vis. Jeg har flere gange ketsjet forgæves i timevis i vandhuller med ellers sikre fund. En anden mulighed er, at stille sig ud i dammen og bruge sine bare ben som "madding". I gamle dage var denne metode almindelig brugt til iglefangst. Men heller ikke det har jeg haft held med. Lægeiglen opholder sig fortrinsvis på lavt vand nær bredden, i bundens dynd eller mellem vandplanter. Iglen registrerer og opsøger uro og bevægelse i vandet. Denne adfærd er det til gengæld en fordel at udnytte. Hvis man står nær bredden og roder lidt i bunden, vil iglerne dukke frem. Så er det bare om at være hurtig og behændig med ketsjeren. Lægeiglen er fredet i Danmark. Fredningen indebærer kun, at arten ikke må indsamles erhvervsmæssigt. Fangst af danske lægeigler, til f.eks. iagttagelse af adfærd, er altså lovligt, men husk at sætte iglerne tilbage i det samme vandhul igen.

## Moderne anvendelse af lægeigler

Lægeiglens kulturhistorie er meget omfattende, og beretter bl.a. om, hvordan dette lille dyr er blevet brugt/misbrugt som lægemiddel i enorme mængder mod alskens dårligdomme. Den historie skal ikke fortælles her, men i de senere år har lægeiglen fået lidt af et come-back. Indenfor plastikkirurgien udnyttes lægeiglens udskillelse af det antikoagulerende stof hirudin. Ved lapoperationer, hvor der transplanteres større eller mindre hudstykker, etableres der bedre blodgennemstrømning gennem iglernes bid. Der sælges ca. 200 importerede igler årligt til hospitaler og private i Danmark, så det kan ikke siges at være en særlig udbredt behandling, men det sker af og til, at den udføres på bl.a. Århus Kommunehospital.

Hirudin har også dannet basis for fremstillingen af salve og gel mod blå mærker, forstuvninger og overfladisk årebetændelse. Denne salve eller gel hedder Hirudoid og virker fremmende for blodgennemstrømningen og opløser koaguleret blod. Det virksomme stof



Fig. 5. Lægeigle, der suger blod. Foto: Tove Yde.

i Hirudoid udvindes ikke af lægeigler, men fremstilles kunstigt.

Og så er lægeiglen i øvrigt gået på internettet. Her kan den bestilles sammen med en pasnings- og brugsanvisning. Adressen er: <http://www.leechesusa.com/case2.htm>

#### **Hvad ved vi ?**

Om lægeiglens præcise udbredelse i Danmark i dag, ved vi ikke ret meget. Der er

mange ubesvarede spørgsmål, og der foreligger kun få, nyere undersøgelser og oplysninger. De nyfund fra hidtil ukendte lokaliteter, der af og til dukker op, tyder på, at lægeiglen muligvis findes på langt flere lokaliteter, end hidtil antaget. Det kan så diskuteres, hvorfor der ikke er dukket flere fund op i forbindelse med f.eks. vandhulsundersøgelser. Måske kan det skyldes, at lægeiglen ikke så let lader sig ketsje på normal vis, det kan også skyldes forveksling med hesteiglen og endvidere kan der være gjort fund, som bare ikke er kendte. En grundig undersøgelse og kortlægning af lægeiglens udbredelse i Danmark kunne være særdeles ønskværdig. Desværre vil det være lidt problematisk at igangsætte sådan en kortlægning som atlasundersøgelse, da arten som nævnt let kan forveksles med hesteigle. Hvis nogle af denne artikels læsere har oplysninger/fund af lægeigle, nye såvel som gamle, er jeg meget interesseret i at høre fra dem.

#### **Forfatterens adresse:**

Horsensvej 127  
8660 Skanderborg  
Tlf: 86 53 88 86

---

## **“Fund af sjældnere og nye Guldsmede-arter i Danmark 1997-1998” - en kommentar**

### **Mogens Holmen**

I 1999 har Henning Pedersen omtrent enslydende i mindst tre tidsskrifter (bl.a. Gejrfuglen) publiceret en række af sine fund fra især 1997-98 af rødlistede og nye danske guldsmedearter - i sammenhæng med en sønderlemmende kritik af Ole Fogh Nielsens nye bog om danske guldsmede (Nielsen, 1998). For de nye fund af arterne er mest kun oplyst årstal og antal findesteder pr. amt.

Henning Pedersens nye fund af 14 arter inkluderer observerede individer af en enkelt ny art for landet samt flere arter, som kun er fundet få steder før i Danmark. Heriblandt 2 arter antaget for at være uddøde, jf guldsmedeafsnittet (Holmen & Pedersen, 1998) i Rødliste 1997. To af de arter, han har fundet nye steder, kan indgå i udpegningsgrundlaget ved oprettelsen af EF-habitatområder (dan-

ske habitatområder blev foreløbigt fastlagt med tilhørende restriktioner i 1998), og for danske forekomster af disse og yderligere 2 af arterne (heriblandt 1 ny for landet) har vi pligt til artsfredning (er i kraft for 3 af arterne) samt til en generel beskyttelse mod ødelæggelse af deres levesteder, jf. EF-habitatdirektivets artikel 12.

Henning Pedersens få oplysninger giver imidlertid næppe hverken myndigheder eller andre mulighed for at tage hensyn til levestederne eller at skaffe yderligere dokumentation om forekomsterne. Et par af fundene kunne endda være taget i betragtning ved udpegningen af EF-habitatområder, hvis de desuden var blevet meddelt tidligere. Henning Pedersen har i artiklerne begrundet de upræcise data med hensyn mod indsamling af bl.a. de fredede arter.

Af en e-mail til mig i 1999 fremgår det, at når han ikke tidligere har nævnt fundene, var det for at undgå, at Ole Fogh Nielsen kunne få kendskab til dem. Med samme begrundelse har Henning Pedersen heller ikke ønsket at medvirke eller bidrage med oplysninger til den statslige overvågning af rødlistede guldsmede i 1999. Derfor har jeg selv startet en sammenfatning af funddata til og med 1999 for disse arter, og Ole Fogh Nielsen har siden påtaget sig feltarbejde og afrapportering ved overvågningen. I øvrigt blev nogle af Henning Pedersens lidt ældre findesteder for meget sjældne guldsmedearter heller ikke dengang oplyst særligt præcist, hvilket ved overvågning betyder vanskeligheder med at fastslå de relevante steder.

I artiklerne retter Henning Pedersen en voldsom kritik mod den udetaljerede belysning af især arternes udbredelse i Nielsen (1998). Samtidigt fremhæver han sit atlasprojekt GOMPHUS, i hvis database han har sammenfattet et imponerende antal af egne og andres guldsmedefunddata fra dette århundrede. Henning Pedersen har tidligere givet klart udtryk for, at han selv ønsker at udgive resultaterne herfra som et samlet værk om de danske guldsmede. De fund han nu har publiceret, umiddelbart efter udgivelsen af Niel-

sen (1998) og 2 år efter, at han overfor omverdenen afbrød sit arbejde med guldsmede, kan nok betragtes som en forsmag på den viden om de danske guldsmede, som Henning Pedersen ønsker at formidle med dette værk.

I forhold til Henning Pedersens seneste artikler kan jeg dog nævne, at *Gomphus vulgatissimus* faktisk også tidligere er fundet i Nordjylland, hvis Hobro medregnes. Desuden var *Ischnura pumilio* før 1998 ikke kun kendt fra 1 UTM-felt i Jylland, men derimod mindst fra 4, hvor jeg blandt de nyere fund også har noteret ét oplyst/gjort af Henning Pedersen i 1990. I forhold til Nielsen (1998) mener jeg, at det fra Zoologisk Museum oplyste fund af *Sympetrum fonscolombei* som ny for Danmark, ikke er korrekt. Det pågældende eksemplar i museets samling ser ud til at være en *S. flaveolum* med reduceret gulfarvning af vingerne.

Jeg vil se frem til den dag, Henning Pedersens værk udkommer. Forhåbentlig uden den tvivl om fundenes rigtighed, som har vist sig udbredt i de respektive faglige kredse, når det drejer sig om nogle af hans publicerede og meddelte fund af bl.a. meget sjældne fugle og planter. Og i alle tilfælde kan jeg glæde mig over Ole Fogh Niensens smukke, guldsmede-appetitvækkende bog.

#### **Forfatterens adresse:**

Gadeledsvej 48  
Gadevang  
3400 Hillerød

## ØBF's bestyrelse:

**Formand:**

Søren Højager, Mejløvænget 4, 8381 Mundelstrup. Tlf. 86 24 25 21

E-mail: soeren.hoejager@skolekom.dk

**Næstformand:**

Per Henriksen, Bøgeskovvej 10, Herskind, 8464 Galten. Tlf. 86 95 45 05

E-mail: per.henriksen@biology.aau.dk

**Kasserer:**

Christian Lange, Europaplads 8, 1.tv., 8000 Århus C. Tlf. 86 19 07 24

E-mail: christian.lange@biology.aau.dk

**Sekretær:**

Tove Yde, Horsensvej 127, Tebstrup, 8660 Skanderborg. Tlf. 86 53 88 86

E-mail: pwyde@post11.tele.dk

**Redaktion Gejrfuglen:**

Christian Lange (ansv. redaktør)

Per G. Henriksen

**Program-redaktør:**

Lars Skipper, Kystvejen 7B 3., 8000 Århus C. Tlf. 86 18 18 62

E-mail: lars.skipper@get2net.dk


**Møde- og ekskursionsudvalg:**


Bent V. Petersen, Ryesgade 52, Gl. Ry, 8680 Ry. Tlf. 86 89 88 90

E-mail: biobent@post1.tele.dk

Jørgen T. Laursen, Engdalsvej 81B, 8220 Brabrand. Tlf. 86 26 12 96

E-mail: jtl@mobilixnet.dk





**ØSTJYSK BIOLOGISK FORENING**

---

**Postboks 169 - 8100 Århus C**